

Laboratoria Polfa Łódź Ibuprofen Max, 400 mg, tabletki powlekane, 50 tabletek

Cena: 39,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	URGO SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ibuprofen Max od Laboratoriów Polfa Łódź to lek wykorzystywany w łagodzeniu bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Dodatkowo obniża podwyższoną temperaturę ciała i wykazuje działanie przeciwzapalne.

Wskazania

Laboratoria Polfa Łódź Ibuprofen MAX stosowany jest w bólach (słabych – umiarkowanych) różnego pochodzenia takich jak np.: bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu, bóle miesiączkowe oraz w gorączce.

Działanie

Ibuprofen należy do grupy leków – niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek likwiduje lub łagodzi ból i stan zapalny oraz zmniejsza gorączkę.

Dawkowanie

Zwykle stosowana dawka Ibuprofenu Max u pacjentów powyżej 12 roku życia (masa ciała powyżej 40 kg) to 1 tabletkę do 3 razy na dobę (do 1200 mg). Odstęp nie powinien być krótszy niż 6h (przy bólach migrenowych niż 4-6h).

Skład

- Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum).
- 1 tabletkę zawiera 400 mg ibuprofenu.
- Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka tabletki: talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwień koszenilowa (E 124), azorubina (E 122), dimetykon.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjenta dotyczą choroby lub stany takie jak: zaburzona czynność wątroby, nerek lub układu krążenia, astma oskrzelowa, alergia, katar sienny, polipy nosa, przewlekłe obturacyjne choroby układu oddechowego, toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej, ospa wietrzna, ostra porfiria przerywana, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego lub niewydolność serca w wywiadzie, jednoczesne stosowanie leków przeciwwzakrzepowych, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia tworzenia się czerwonych krwinek, cukrzyca, okres bezpośrednio po dużym zabiegu operacyjnym.

Producent

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
Warszawa