

Lacidofil, 20 kapsułek



Cena: 30,47 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	Lallemand Sas
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	LALLEMAND SAS
Przeznaczenie	Biegunka, Odbudowa flory bakteryjnej
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lacidofil to produkt leczniczy, który zawiera bakterie kwasu mlekowego, naturalnie występujące w przewodzie pokarmowym. Te bakterie, które powodują skutki przed patogennymi mikroorganizmami, zapobiegają zaburzeniom równowagi flory jelitowej, wywołanym w przykładzie przez zastosowanie, skutki lub wystąpienie biegunki.

Działanie

Lacidofil zawiera bakterie kwasu mlekowego, które naturalnie bytują w przewodzie pokarmowym człowieka. Stanowią naturalną ochronną barierę przed drobnoustrojami oraz są odpowiedzialne za utrzymanie równowagi flory jelitowej.

Dawkowanie

Zapobieganie zaburzeniom flory jelitowej - w trakcie i po antybiotykoterapii, zapobieganie biegunce podróży. Lek należy stosować minimum 10 dni, zaczynając od początku antybiotykoterapii lub przed/w czasie podróży.

- Dzieci poniżej 4 lat: 1 kapsułka na dobę.
- Dzieci od 4 do 12 lat: 1-2 kapsułki na dobę.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.

Leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Lek należy stosować przez minimum 14 dni.

- Niemowlęta: 1 kapsułka na dobę.
- Dzieci od 1 do 4 lat: 1 kapsułka 2 razy na dobę.
- Dzieci od 4 lat do 12 lat: 1 kapsułka 3 razy na dobę.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 kapsułki 3 razy na dobę.



Skład

Substancją czynną jest: Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052.
Substancje pomocnicze: kwas askorbowy, magnezu stearynian, maltodekstryna, żelatyna.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lacidofil:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli jest stwierdzona nietolerancja niektórych cukrów - przed zastosowaniem leku, należy skonsultować się z lekarzem,
- w przypadku uczulenia na białko mleka krowiego lub soję.

Działania niepożądane

- reakcje nadwrażliwości typu wysypka, biegunka.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli u pacjenta występują: gorączka, wymioty, silny ból brzucha, ostre zapalenie trzustki, pacjent ma założony cewnik w żyłę centralnej, pacjent jest po operacji chirurgicznej - w szczególności z zapaleniem mięśnia sercowego; występuje krwawa biegunka (w szczególności u niemowląt i osób starszych); jeśli pacjent ma obniżoną odporność w związku z przeszczepem narządu, radioterapią i/lub chemioterapią, długotrwałą terapią kortykosteroidami; u dzieci z zespołem krótkiego jelita.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

TAKEDA