

Lactoangin spray 30 g

Cena: 20,98 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g
Postać	Spray
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające, Ochronne, Regenerujące (odbudowujące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 3 lat

Opis produktu

Opis

Lactoangin spray przeznaczony dla osób powyżej 3 roku życia to produkt medyczny stosowany w pomocniczym leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, zwłaszcza w jamie ustnej i gardle. Działa nawilżająco, kojąco oraz łagodzi dolegliwości bólowe. Jego skład obejmuje metabolity bakterii kwasu mlekowego, głównie kwas mlekowy, octowy, inne kwasy organiczne, a także mentol i olejek miętowy. Te składniki naturalnie wspierają leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Dodatkowo, spray ułatwia przywracanie równowagi mikrobiologicznej w gardle i jamie ustnej, co zmniejsza ryzyko próchnicy, powstawania płytki nazębnej, stanów zapalnych dziąseł i neutralizuje nieprzyjemny oddech.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 3. roku życia do ukończenia 6. roku życia: 1 dawka preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
- Dzieci powyżej 6. roku życia i dorośli: 2-3 dawki preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Składniki

Metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju *Lactobacillus*, mentol, olejek miętowy i substancje pomocnicze: glicerol, glikol propylenowy, aromat cytrynowy naturalny, sorbinian potasu, guma ksantanowa, sukraloza oraz woda.

Zastosowanie

Lactoangin stosuje się:

- wspomagająco w leczeniu infekcji jamy ustnej i gardła, w tym kandydozy (drożdżycy);
- w celu łagodzenia bólu gardła;
- w celu nawilżania jamy ustnej i gardła;
- pomocniczo w stanach zaburzenia równowagi mikroflory jamy ustnej i gardła w celu niwelowania nieprzyjemnego oddechu, zapobiegania próchnicy, zapobiegania tworzenia płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł.



Sposób użycia

- Lactoangin spray do jamy ustnej i gardła należy wstrząsnąć przed użyciem.
- Unieść aplikator przekręcając go na bok.
- Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę w celu napełnienia aplikatora i uzyskania prawidłowego rozpylenia.
- Umieścić aplikator w ustach i nacisnąć pompkę.
- Czynność powtórzyć odpowiednią ilość razy, dostosowując dawkę do wieku.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.

Ostrzeżenia

- W okresie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
- Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.
- Jeśli po zastosowaniu produktu pojawią się jakiegokolwiek niepokojące objawy (pieczenie, nasilenie bólu), należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Producent

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek
BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków