

Lactulose-MIP, syrop, (9,75 g / 15 ml), 200 ml



Cena: 14,67 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	200 ml
Postać	Syrop
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lactulose-MIP to syrop leczniczy dostępny bez recepty, zawierający dwucukier zbudowany z D-galaktozy i fruktozy.

Wskazania

Wskazania do stosowania: zaparcia oraz zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Działanie

Laktuloza jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialne są dwa procesy:

- cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie objętości treści jelitowej), co pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit;
- kwasy bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.

Przyjmuje się, że za działanie laktulozy polegające na zmniejszeniu stężenia amoniaku we krwi, odpowiedzialne są następujące procesy:

- rozkład laktulozy powoduje zmniejszenie wartości pH, co prowadzi do jonizacji amoniaku. W ten sposób powstają niewchłanialne i nietoksyczne jony amoniowe. Proces ten prowadzi do zmniejszenia wchłaniania amoniaku z okrężnicy;
- pod wpływem zwiększonego stężenia węglowodanów i wynikającego stąd zakwaszenia treści jelita, bakterie proteolityczne jelita zostają wyparte na rzecz bakterii sacharolitycznych, dzięki czemu powstaje mniej amoniaku;
- zmniejszona wartość pH w jelicie powoduje, że amoniak z krwi przechodzi bezpośrednio do kwaśnej treści jelita;
- podanie laktulozy prowadzi do zwiększenia stężenia węglowodanów w okrężnicy. Dzięki temu dla całej flory bakteryjnej powstaje względny deficyt azotu, który następnie jest kompensowany przez zużycie amoniaku pochodzącego z rozkładu mikroorganizmów.

Skład



- Substancją czynną leku jest laktuloza.
- 15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy (Lactulosum)
- 1 ml syropu zawiera 0,65 g laktulozy
- Substancje pomocnicze: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma: uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; niedrożność jelit; zapalenie przewodu pokarmowego; galaktozemię.

Producent

CHEPHASAAR NIEMCY