

Lactulose-MIP, syrop, (9,75 g / 15 ml), 200 ml



Cena: 23,56 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	200 ml
Postać	Syrop
Producent	MIP PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lactulose-MIP to syrop leczniczy, zawierający dwucukier złożony z D-galaktozy i fruktozy. Dostępny bez recepty, wykazuje łagodne działanie przeczyszczające.

Wskazania

Wskazania do stosowania: zaparcia oraz zapobieganie i leczenie encefalopatii wątrobowej.

Działanie

Laktuloza jest dwucukrem złożonym z D-galaktozy i fruktozy. Jest lekiem łagodnie przeczyszczającym o działaniu osmotycznym. Za przeczyszczające działanie laktulozy odpowiedzialne są dwa procesy:

- cukier i kwasy powodują zmiany ciśnienia osmotycznego (zwiększenie objętości treści jelitowej), co pośrednio wpływa na pobudzenie perystaltyki jelit;

kwasy bezpośrednio pobudzają perystaltykę jelit.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież (14-17 lat): Dawka początkowa: 15-45 ml w 1 lub 2 dawkach podzielnych; Dawka podtrzymująca: 15-30 ml
- Dzieci (7-14 lat): Dawka początkowa: 15 ml; Dawka podtrzymująca: 10-15 ml
- Dzieci (1-6 lat): Dawka początkowa: 5-10 ml; Dawka podtrzymująca: 5-10 ml
- Niemowlęta (poniżej 1 roku życia): Dawka początkowa: do 5 ml; Dawka podtrzymująca: do 5 ml

Skład

- Substancją czynną leku jest laktuloza.
- 15 ml syropu zawiera 9,75 g laktulozy (Lactulosum)



- 1 ml syropu zawiera 0,65 g laktulozy
- Substancje pomocnicze: aromat wiśniowy IFF 16-21-3618, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma: uczulenie na laktulozę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; niedrożność jelit; zapalenie przewodu pokarmowego; galaktozemię.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Zaburzenia żołądka i jelit (w przypadku stosowania zbyt dużych dawek):

Bóle brzucha, wzdęcia, nudności, wymioty, biegunka.

- Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Ostrzeżenia

- 15 ml syropu zawiera do 2,4 g węglowodanów tm.in. fruktozę, galaktozę, laktozę, co odpowiada 0,2 jednostkom chlebowym, dlatego lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z cukrzycą.
- Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lap-pa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Producent

CHEPHASAAR NIEMCY