

Lactulosum Hasco, 2,5 g/5 ml, syrop, 500 ml



Cena: 44,40 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	500 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lactulosum Hasco to lek w postaci syropu zawierający laktulozę w formie cieczy, będącą syntetycznym dwucukrem. Syrop ma działanie przeczyszczające i jest przeznaczony do stosowania przez dorosłych, młodzież oraz dzieci, w tym niemowlęta.

Wskazania

Produkt wskazany jest dla osób w każdym wieku, którym dolegają zaparcia, a także w celu zapobiegania i leczenia encefalopatii wątrobowej.

Działanie

Syrop Lactulosum Hasco zawiera laktulozę ciekłą, która rozkładana jest w okrężnicy do kwasu mlekowego, mrówkowego i octowego, a także do dwutlenku węgla. Powstałe kwasy powodują obniżenie pH w okrężnicy do pH = 5–5,5. Obniżone pH przyczynia się do zatrzymania wody w jelicie, grubym, a co za tym idzie do zwiększenia i rozluźnienia mas kałowych oraz do stymulacji perystaltyki jelit.

U osób z encefalopatią wątrobową laktuloza ciekła dodatkowo wpływa na zmniejszenie toksyczności amoniaku - obniżone pH przyczynia się do przekształcenia amoniaku w jony amonowe, które są nietoksyczne i nie wchłaniają się w jelitach.

Dawkowanie

- Dorośli: początkowo, przez pierwsze 3 dni stosować 45 ml syropu (22,5 g laktulozy ciekłej) na dobę, jednorazowo przed śniadaniem lub podzielone na 3 dawki po 15 ml przyjmowane 3 razy na dzień przed posiłkami. Dawka podtrzymująca: 15 ml syropu (7,5 g laktulozy ciekłej) przyjmowane na czczo.
- Dzieci powyżej 3 lat: początkowo podawać od 5 do 15 ml syropu (2,5 g do 7,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
- Dzieci poniżej 3 lat: dawka początkowa wynosi 5 ml syropu (2,5 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.
- Niemowlęta: początkowa dawka to 2,5 ml syropu (1,25 g laktulozy ciekłej) na dobę. Następnie dawkę można stopniowo



zwiększać co 3 dni, do uzyskania prawidłowych wypróżnień.

Skład

- Substancją czynną leku jest laktuloza ciekła.
- Pozostałymi składnikami leku są: aromat pomarańczowy 240.016, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Ostrzeżenia

- Jeśli dawka początkowa wywołuje nudności należy ją zmniejszyć.
- Lek zawiera laktozę i galaktozę, pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów przed przyjęciem syropu powinni skonsultować się z lekarzem.
- Długotrwałe stosowanie lub stosowanie w nadmiernych ilościach może przyczynić się do wystąpienia biegunki z nadmierną utratą wody i elektrolitów oraz do zwiększenia stężenia sodu we krwi. Z tych względów należy wykonywać okresowo badanie stężenia elektrolitów, w szczególności dotyczy się to osób w wieku podeszłym stosujących syrop dłużej niż 6 miesięcy.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław