

Lactulosum Orifarm Forte, 667 mg/ml, syrop, 150 ml



Cena: 20,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	150 ml (but. ze szkła)
Postać	Syrop
Producent	ORIFARM HEALTHCARE A/S
Przeznaczenie	Przeczyszczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów, Od 1 miesiąca życia

Opis produktu

Opis

Lek Lactulosum Orifarm Forte to syrop o smaku truskawkowym, który działa przeczyszczająco i jest przeznaczony do leczenia zaparć oraz encefalopatii wątrobowej.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania Lactulosum są przewlekłe zaparcia, encefalopatia wątrobowa.

Działanie

Lek Lactulosum ma działanie przeczyszczające.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież: dobową dawkę początkową (pierwsze trzy dni) 15-45 ml (10,0 - 30,0 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca: 15-30 ml (10,0 - 20,0 g laktulozy).
- Dzieci (7-14 lat): dobową dawkę początkową (pierwsze trzy dni) 15-30 ml (10,0 - 20,0 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca: 10-15 ml (6,7 - 10,0 g laktulozy).
- Dzieci (1-6 lat): dobową dawkę początkową (pierwsze trzy dni) 5-10 ml (3,3 - 6,7 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca 5-10 ml (3,3 - 6,7 g laktulozy).
- Niemowlęta poniżej 1 roku: dawka początkowa (pierwsze trzy dni) 5-10 ml (3,3 - 6,7 g laktulozy). Dobowa dawka podtrzymująca do 5 ml (do 3,3 g laktulozy).

Skład

- Substancją czynną leku jest laktuloza (Lactulosum).
- Substancje pomocnicze: woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeżeli występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku oraz u osób z niedrożnością jelit, a także u osób z galaktozemią.

Ostrzeżenia

- Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent choruje na: bóle brzucha o nieustalonej przyczynie; zespół żołądkowo-sercowy tzn. zespół Roemhelda (choroba w trakcie której nagromadzony gaz w przewodzie pokarmowym lub zaburzenia normalnego pasażu treści żołądkowej wywołują objawy sercowe); cukrzycę.
- Lactulosum Orifarm Forte zawiera fruktozę, galaktozę, laktozę, sodu benzoesan.
- Lek należy przechować w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

Producent

ORIFARM HEALTHCARE A/S

Galeria

