

Lakcid Intima, kapsułki dopochwowe, twarde, 10 kapsułek



Cena: 54,07 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	LAKCID
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Odbudowa flory bakteryjnej, Uplawy
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Lakcid Intima to kapsułki dopochwowe, będące produktem leczniczym, zawierające liofilizowane, żywe pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869 i *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870, wyizolowane z pochwy zdrowej kobiety. Zalecane do stosowania w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy.

Wskazania

Lakcid Intima zaleca się stosować w celu utrzymania lub przywrócenia prawidłowej flory bakteryjnej pochwy u kobiet. Można stosować u dziewcząt w wieku 12 do 16 lat (które zaczęły miesiączkowanie) po zaleceniu przez lekarza, w takich samych dawkach jak u dorosłych.

Działanie

Bakterie zawarte w Lakcid Intima posiadają silne właściwości adhezyjne do nabłonka pochwy, które umożliwiają im kolonizację i przeżywalność w pochwie. Oba szczepy produkują kwas mlekowy, a szczep *Lactobacillus gasseri* DSM 14869 produkuje nadtlenek wodoru, a przez to stwarzają niekorzystne środowisko do namnażania się bakterii chorobotwórczych.

Dawkowanie

- Profilaktycznie, niezwłocznie po miesiączce: Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 4-6 dni, dopochwowo.
- Po antybiotykoterapii: Jedna kapsułka na dobę (przed snem) przez 6-8 dni, dopochwowo.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: Pałeczki *Lactobacillus gasseri* DSM 14869 nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę,

Pałeczki *Lactobacillus rhamnosus* DSM 14870 nie mniej niż 108 CFU* na kapsułkę.



*CFU (ang. Colony Forming Unit) - jednostka tworząca kolonię

- Substancje pomocnicze: laktytol jednowodny, skrobia kukurydziana, guma ksantan, glukoza bezwodna, magnezu stearynian. Osłonka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Lakcid Intima, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

W przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku Lakcid Intima może wystąpić pieczenie w miejscu podania.

Ostrzeżenia

- U kobiet z ciężkimi zaburzeniami układu odpornościowego należy zachować szczególną ostrożność.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Omega Pharma Poland
Aleja Niepodległości 18
Warszawa