

Laktomag B Produkt leczniczy 50 sztuk



Cena: 19,92 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nadpobudliwość, Niedobór minerałów, Niedobór witamin, Skurcze, Zmęczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Laktomag B6 to lek leczniczy zawierający magnez w postaci soli organicznej oraz witaminę B6, która poprawia przyswajalność magnezu. Ten preparat jest przeznaczony do stosowania w celu zapobiegania niedoborowi magnezu i/lub witaminy B6.

Wskazania

Uzupełnianie stwierdzonych niedoborów magnezu, stany przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego, nadpobudliwość nerwowo-mięśniowa, sytuacje powodujące stres, stany niepokoju i depresji, zaburzenia snu, bóle mięśni, w okresie szybkiego wzrostu u dzieci i młodzieży, podczas intensywnej pracy umysłowej, przy uczuciu drętwienia i mrowienia w kończynach, podczas rekonwalescencji po złamaniu kości, w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

Działanie

Uzupełniające niedobory magnezu oraz witaminy B6 w codziennej diecie.

Dawkowanie

Dzieci 1-3 lat: 2 x dziennie po 1/2 tabletki,
Dzieci 4-6 lat: 3 x dziennie po 1/2 tabletki,
Dzieci 7-10 lat: 2 x dziennie po 1 tabletkę,
Dzieci powyżej 10 lat: 3 x dziennie po 1 tabletkę,
Dorośli: 3 x dziennie po 1 tabletkę

Skład

(1 tabletkę) zawiera: 1000mg wodorooasparagianu magnezu (70mg jonów magnezu), witaminę B6 5mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, stearynian magnezu, powidon, krzemionka koloidalna, aspartam, aromat bananowy.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Laktomag B6w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz jeśli pacjent cierpi na: ciężką niewydolność wątroby i nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, znaczne niedociśnienie tętnicze, zwolniona akcja serca (poniżej 50 uderzeń na minutę), myasthenia gravis, choroba Parkinsona (leczona lewodopą bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy), zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.

Ostrzeżenia

- Należy zachować odstęp czasu jeśli pacjent przyjmuje tetracykliny (antybiotyki).
- Jeśli podczas stosowania leku wystąpią zaburzenia czynności nerek i serca, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny, może być szkodliwy u osób z fenyloketonurią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

