

Laremid, 2 mg, tabletki, 10 tabletek

Cena: 15,04 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LAREMID
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Biegunka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Laremid to lek stosowany w objawowym leczeniu biegunki.

Wskazania

- Objawowe leczenie ostrej i przewlekłej biegunki,
- W przetoce jelita krętego w celu zmniejszenia liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Działanie

Laremid wykazuje działanie przeciwbiegunkowe m.in. poprzez hamowanie propulsywnej perystaltyki, wydłuża czas pasażu jelitowego, zwiększa wchłanianie wody i elektrolitów.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

- Ostra biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki dla dorosłych i 1 tabletka dla dzieci, następnie 1 tabletka po każdym kolejnym wolnym stolcu.
- Przewlekła biegunka: początkowa dawka - 2 tabletki dla dorosłych i 1 tabletka dla dzieci; tę początkową dawkę należy zmodyfikować aż do momentu uzyskania od 1 do 2 normalnych stolców na dobę, co zazwyczaj osiąga się poprzez stosowanie dawki podtrzymującej wynoszącej od 1 do 6 tabletek (od 2 do 12 mg) na dobę.

Skład

- Substancją czynną jest: chlorowodorek loperamidu.
- 1 tabletka zawiera 2 mg loperamidu chlorowodorku (Loperamidi hydrochloridum).

- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Laremid:

- w przypadku nadwrażliwości na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- u dzieci poniżej 6 lat,
- w przypadku nasilonej biegunki z krwią i wysoką gorączką,
- jeśli pacjent ma wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
- w przypadku ostrej biegunki wywołanej przez bakterie chorobotwórcze lub rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (związane ze stosowaniem antybiotyków),
- w przypadkach, gdy powinno unikać się zwolnienia perystaltyki, np. w niedrożności jelit, rozszerzeniu okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- nudności, wzdęcia, zaparcie, bóle głowy.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- senność, zawroty głowy,
- dyskomfort w jamie brzusznej, ból w nadbrzuszu, wymioty, niestrawność,
- wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- reakcja nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy,
- obniżony poziom świadomości, zaburzenia koordynacji ruchowej
- niedrożność jelita,
- świąd, pokrzywka,
- zmęczenie.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera laktozę - w przypadku wcześniejszego stwierdzenia u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów należy przed przyjęciem leku skonsultować się z lekarzem.
- Leczenie Laremidem jest wyłącznie leczeniem objawowym.
- U pacjentów przyjmujących zbyt duże dawki loperamidu zaobserwowano występowanie ciężkich zaburzeń pracy serca.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci .
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa

Galeria



LAREMID® **LEK**

**WYJĄTKOWO SZYBKI
NA BIEGUNKĘ**



Działa w ciągu godziny po podaniu
2 tabletek*

*Laremid Charakterystyka Produktu Leczniczego z dnia 29.08.2019 r.

LAREMID® **LEK**

**WYJĄTKOWO SZYBKI
NA BIEGUNKĘ**



Hamuje
peristaltykę jelit



Zmniejsza
natychmiastową
potrzebę
wypóżnienia



Zwiększa
wchłanianie
wody
i elektrolitów

LAREMID® **LEK**

**WYJĄTKOWO SZYBKI
NA BIEGUNKĘ**



* Średnia na 189 opinii dostępnych w serwisie Ceneo.pl, stan na dzień 28.11.2022, 25694 https://www.ceneo.pl/47795904?utm_source=leki