

Larimax Hydro, spray, łagodzi objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, 30 ml

Cena: 23,10 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 ml
Postać	Spray
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis
Larimax Hydro to spray medyczny przeznaczony do łagodzenia podrażnień błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

Wskazania

- Wyrób do stosowania doustnego (na śluzówkę jamy ustnej i gardła).
- Wyrób medyczny LARIMAX* HYDRO stosuje się w celu nawilżania i powlekania podrażnionej śluzówki jamy ustnej i gardła.
- Preparat łagodzi objawy związane z kaszlem, chrypką, suchością jamy ustnej, odczuciem bólu i pieczenia w gardle.
- Zaleca się stosowanie wyrobu medycznego LARIMAX* HYDRO jako wspomaganie leczenia różnego typu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, łagodzenia objawów suchości jamy ustnej, suchego kaszlu i chrypki.
- Wyrób medyczny jest polecany także osobom szczególnie narażonym na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych (zanieczyszczone powietrze, klimatyzacja) oraz osobom, których praca związana jest z obciążaniem strun głosowych (np. nauczyciele, śpiewacy).

Działanie

- Wyrób łagodzi objawy związane z kaszlem, chrypką, suchością jamy ustnej, odczuciem bólu i pieczenia w gardle.
- Zaleca się stosowanie wyrobu medycznego Larimax* HYDRO jako wspomaganie leczenia różnego typu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz łagodzenia objawów suchości jamy ustnej, suchego kaszlu i chrypki.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 1. roku życia: rozpylić 1-2 dawki sprayu na tylną ścianę gardła kilka razy dziennie (w miarę potrzeby).
- Dorośli: rozpylić 2-3 dawki sprayu na tylną ścianę gardła kilka razy dziennie (w miarę potrzeby).



Skład

Woda demineralizowana, ksylitol, wyciąg z porostu islandzkiego, wyciąg z malwy, wyciąg z lipy, hialuronian sodu, aromat cytrynowy, chlorek benzalkoniowy, wersenian dwusodowy, gliceryna.

Sposób użycia

- Wyrób jest bezpieczny zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci powyżej 1. roku życia.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują przez dłuższy czas należy skonsultować się z lekarzem.
- Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z instrukcją używania załączoną do opakowania.
- Wyrób do stosowania doustnego (na śluzówkę jamy ustnej i gardło).
- Wstrząsnąć przed użyciem.
- Preparat rozpylić na tylną ścianę gardła.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować wyrobu w przypadku występowania nadwrażliwości (alergii) na jakikolwiek składnik wyrobu.
- Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
- W celu zachowania właściwości wyrobu nie należy manipulować aplikatorem.
- Dla dzieci powyżej 1. roku życia: wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.
- Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.

Producent

Gofarm Sp. z o.o. Sp.k
Górników 21/26
30-819 Kraków