

Legalon 140, 140 mg, kapsułki twarde, 20 kapsułek

Cena: 21,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 kapsułki
Postać	Kapsułki twarde
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Regenerujące, Wspomagające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Legalon 140 to lek dostępny w formie twardych kapsułek, zawierający suchy wyciąg z owoców ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum). Sylimaryna, obecna w ostropestzie plamistym, jest używana jako wsparcie w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych oraz marskości wątroby. Legalon 140 jest przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 12 lat oraz dorosłych.

Wskazania

- Leczenie stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby;
- Pomocniczo u pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia zapalne wątroby oraz marskość wątroby.

Działanie

Substancją czynną Legalon 140 jest zespół flawonoliganów zwany sylimaryną, który występuje w owocach ostropestu plamistego, zawierający m.in. sylibininę. Sylimaryna stosowana jest w leczeniu schorzeń wątroby.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Początkowo 1 kapsułka 3 razy dziennie (co odpowiada 420 mg sylimaryny).

Skład

- Substancją czynną jest wyciąg suchy z owoców ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum).

Ekstrahent: etylu octan(98% V/V).

- Substancje pomocnicze: mikrokryształiczna celuloza, skrobia kukurydziana, sodu karboksymetyloskrobia (typ A), sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian. Otoczka: żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować Legalon 140:

- uczulenie na substancje czynne występujące w ostropestzie i (lub) innych roślinach z rodziny astrowatych Asteraceae, bądź na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zaburzenia żołądka i jelit,
- luźny stolec.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości,
- duszność,
- wysypka.

Ostrzeżenia

- Lek nie powinien być stosowany w celu leczenia ostrych zatruc.
- W przypadku wystąpienia objawów żółtaczki (jasne do ciemnożółtego przebarwienie skóry, żółte zabarwienie białkówki oczu) należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas leczenia należy unikać czynników szkodliwych dla wątroby.

Producent

DELFARMA/MADAUS
Dostawcza 17
Łódź