

Legalon, 140 mg, kapsułki, 20 kapsułek

Cena: 19,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	PHARMAPOINT S.A.
Przeznaczenie	Regenerujące
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Legalon 140 jest lekiem roślinnym, który wspiera procesy regeneracyjne oraz poprawia sprawność funkcjonalną wątroby.

Wskazania

Wskazania do stosowania:

- leczenie stanów po toksycznym uszkodzeniu wątroby;
- pomocniczo u pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia zapalne wątroby oraz marskość wątroby.

Działanie

Legalon 140 wytwarzany jest w postaci kapsułek twardych, które zawierają w swoim składzie suchy wyciąg z owoców ostropestu plamistego. Substancją czynną owoców ostropestu plamistego jest zespół flawonoliganów zwany sylimaryną, zawierający między innymi sylibininę.

Dawkowanie

Na początku leczenia zaleca się 1 kapsułkę 3 razy na dobę (co odpowiada 420 mg sylimaryny). Jako dawkę podtrzymującą przyjmuje się 1 kapsułkę 2 razy na dobę (co odpowiada 280 mg sylimaryny).

Skład

- Substancją czynną leku jest Silybi mariani fructus extractum siccum 173,0-186,7 mg (wyciąg standaryzowany 36-44:1, ekstrahent: octan etylu 98% V/V) co odpowiada 58,0–62,5% sylimaryny obliczanej jako sylibinina.
- Substancje pomocnicze to: mikrokryształiczna celuloza, skrobia kukurydziana, sodu karboksymetyloskrobia (typ A), sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian. - Skład otoczki: żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, sodu laurylosiarczan

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Legalon 140



- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne występujące w ostropestzie i (lub) innych roślinach z rodziny astrowatych Asteraceae, bądź na którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- zaburzenia żołądka i jelit,
- luźny stolec

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości,
- duszność,
- wysypka

Ostrzeżenia

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

MADAUS