

Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g

Cena: 35,98 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 g
Postać	Żel
Producent	A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Przeciwzakrzepowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Żel Lioton 1000 to lek przeciwobrzękowy, przeciwzakrzepowy i przeciwzapalny zawierający heparynę. Stosuje się go między innymi jako środek pomocniczy w leczeniu żylaków kończyn dolnych, krwaków podskórnych, stłuczeń i obrzęków. Żel aplikuje się na skórę.

Wskazania

Lioton 1000 stosuje się w leczeniu wspomagającym chorób żył powierzchownych takich, jak zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych. Lek można stosować także przy krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Działanie

Lek Lioton 1000 zawiera heparynę, która powoduje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwzapalne, przeciwobrzękowe.

Dawkowanie

Lek stosuje się na skórę. Podczas aplikacji należy 3–10cm pasek żelu delikatnie wmasowywać aż do wchłonięcia żelu. Zwykle stosowane dawkowanie żelu Lioton 1000 to 1 do 3 aplikacji dziennie. W przypadku obrzęków po urazach zaleca się stosowanie leku przez okres do 10 dni, a w przypadku leczenia chorób żył powierzchownych przez 1 do 2 tygodni.

Skład

- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).
- 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 IU) heparyny sodowej.
- Substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować leku Lioton 1000:

- w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (ze względu na obecność hydroksybenzoesanów metylu i propylu jako substancji pomocniczych nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny);
- na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne, w przypadku krwawienia,
- w okolicy oczu, nosa i ust.

Działania niepożądane

- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (zaczerwienienie i świąd skóry) lub objawy reakcji pseudoalergiczných. W takich przypadkach leczenie należy przerwać.
- U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po podaniu miejscowym heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

MENARINI
C/Alfonso XII, 587 E; Hiszpania
Barcelona