

Lioton żel 1000 j.m. 100 g

Cena: 68,15 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LIOTON
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE RIUNITE S.R.I.
Przeznaczenie	Stłuczenie, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Lioton 1000 jest lekiem dostępnym w postaci żelu do aplikacji na skórę, którego aktywnym składnikiem jest heparyna sodowa. Jest stosowany wspomagająco w terapii chorób naczyń powierzchniowych, takich jak zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył oraz żylaki kończyn dolnych. Jest również wykorzystywany w przypadku obrzęków, stłuczeń i krwiaków podskórnych. Heparyna obecna w żelu jest naturalnym związkem, który zapobiega krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych. Wykazuje działania przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Poprzez oddziaływanie na mediatorów zapalenia, może przyczynić się do złagodzenia objawów związanych z chorobami naczyń powierzchniowych, takich jak uczucie ciężkości i obrzęki nóg. Ponadto, ograniczając wyciek z naczyń w stanie zapalnym, przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Hamuje procesy krzepnięcia krwi i pozytywnie wpływa na mikrokrążenie. Żel może być stosowany samodzielnie jako miejscowa terapia wspomagająca lub jako uzupełnienie leczenia doustnego. Po zastosowaniu, daje przyjemne uczucie chłodzenia w obszarze dyskomfortu. Dodatkowo, ma delikatny zapach lawendy i neroli, a jego nietłusty charakter pozwala na wygodne użytkowanie w domu, w podróży czy podczas codziennych czynności.

Wskazania

Lek Lioton 1000 stosuje się wspomagająco:

- w chorobach żył powierzchownych takich jak zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych,
- w krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

Działanie

Miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12 lat: na powierzchnię skóry należy nakładać pasek żelu o długości 3-10 cm i delikatnie masować aż do całkowitego

wchłonięcia; stosować 1-3 razy na dobę.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: heparyna sodowa (Heparinum natricum) 8,5 mg (1000 IU),
- substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (zwłaszcza u osób z alergią na parabeny).
- na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust.
- w przypadku krwawienia.
- Leku nie wolno przyjmować doustnie

Działania niepożądane

- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (świąd i zaczerwienienie skóry) lub objawy reakcji pseudoalergicznyc. Jeżeli to nastąpi, należy przerwać leczenie.
- U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po miejscowym zastosowaniu heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.