

# Lioton żel 1000 j.m. 50 g

Cena: 39,43 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LIOTON
Opakowanie	50 g
Postać	Żel
Producent	A.MENARINI INDUSTRIE PHARMACEUTICHE RIUNITE S.R.I.
Przeznaczenie	Stłuczenie, Żylaki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Lioton 1000** jest lekiem dostępnym w postaci żelu do aplikacji na skórę, którego aktywnym składnikiem jest heparyna sodowa. Jest stosowany wspomagająco w terapii chorób naczyń powierzchniowych, takich jak zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył oraz żylaki kończyn dolnych. Jest również wykorzystywany w przypadku obrzęków, stłuczeń i krwiaków podskórnych. Heparyna obecna w żelu jest naturalnym związkem, który zapobiega krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych. Wykazuje działania przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Poprzez oddziaływanie na mediatorów zapalenia, może przyczynić się do złagodzenia objawów związanych z chorobami naczyń powierzchniowych, takich jak uczucie ciężkości i obrzęki nóg. Ponadto, ograniczając wyciek z naczyń w stanie zapalnym, przeciwdziała powstawaniu obrzęków. Hamuje procesy krzepnięcia krwi i pozytywnie wpływa na mikrokrążenie. Żel może być stosowany samodzielnie jako miejscowa terapia wspomagająca lub jako uzupełnienie leczenia doustnego. Po zastosowaniu, daje przyjemne uczucie chłodzenia w obszarze dyskomfortu. Dodatkowo, ma delikatny zapach lawendy i neroli, a jego nietłusty charakter pozwala na wygodne użytkowanie w domu, w podróży czy podczas codziennych czynności.

### Wskazania

Lek Lioton 1000 stosuje się wspomagająco:

- w chorobach żył powierzchownych takich jak zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu żył, żylakach kończyn dolnych,
- w krwiakach podskórnych, stłuczeniach, obrzękach.

### Działanie

Miejscowe przeciwzakrzepowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

### Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12 lat: na powierzchnię skóry należy nakładać pasek żelu o długości 3-10 cm i delikatnie masować aż do całkowitego

wchłonięcia; stosować 1-3 razy na dobę.

#### Skład

1 g żelu zawiera:

- substancję czynną: heparyna sodowa (Heparinum natricum) 8,5 mg (1000 IU),
- substancje pomocnicze: karbomer 940, propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%, olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, trietanolamina, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę lub którykolwiek ze składników leku (zwłaszcza u osób z alergią na parabeny).
- na otwarte rany lub sączące się zmiany skórne. Nie stosować w okolicy oczu, nosa i ust.
- w przypadku krwawienia.
- Leku nie wolno przyjmować doustnie

#### Działania niepożądane

- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy reakcji alergicznych (świąd i zaczerwienienie skóry) lub objawy reakcji pseudoalergiczných. Jeżeli to nastąpi, należy przerwać leczenie.
- U niektórych pacjentów, u których pierwotnie występuje czerwienica prawdziwa, po miejscowym zastosowaniu heparyny w żelu mogą pojawić się zmiany skórne.

#### Ostrzeżenia

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono skazę krwotoczną

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.