


Lipancia, kapsułki, 8000 j. lipazy, kapsułki, 20 kapsułek



Cena: 29,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułka
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ. FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Niestrawność, Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lipancia 8000 to lek zawierający pankreatynę, czyli mieszaninę enzymów trzustkowych. Stosowany jest w celu uzupełnienia poziomu enzymów trzustkowych po wycięciu trzustki oraz poprawy trawienia w przypadkach zmniejszonego wydzielania enzymów.

Wskazania

Lek Lipancia 8000 jest stosowany u dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki.

Działanie

Lek Lipancia 8000 zawiera enzymy, które działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie. Leczenie znacząco zmniejsza nasilenie objawów zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki w tym: bóle brzucha, wzdęcia, reguluje częstość wypróżnień oraz poprawia konsystencję stolca.

Dawkowanie

Dawkowanie leku powinno być ustalone indywidualnie, zależne od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.

Skład

- Substancją czynną leku jest: pankreatyna (Pancratinum)
- 1 kapsułka zawiera pankreatynę o aktywności: lipazy 8000 j. Ph. Eur., amylazy 5750 j. Ph. Eur., proteaz 450 j. Ph. Eur.
- Substancje pomocnicze: kwasy metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), symetykon, emulsja 30% trietylu cytrynian; talk, żelatyna; żelaza tlenek czerwony (E 172); tytanu dwutlenek (E 171).

Przeciwwskazania

Leku nie stosować jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę, białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów): bóle brzucha.
- Często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, biegunka.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wysypka.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy zachować ostrożność jeśli lek podawany jest dzieciom z mukowiscydozą przyjmującym duże dawki enzymów, ponieważ w rzadkich przypadkach zanotowano u tych dzieci zwężenie jelita.

Producent

POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa

Galeria

