

# Loper 2 mg, 10 tabletek

Cena: 7,58 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn                             |
| Marka           | SUN-FARM                                                          |
| Opakowanie      | 10 tabletek                                                       |
| Postać          | Tabletka                                                          |
| Producent       | SUN-FARM SP. Z O.O.                                               |
| Przeznaczenie   | Przeciwbiegunkowe                                                 |
| Rodzaj produktu | Produkt leczniczy                                                 |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat |

## Opis produktu

### Opis

**Loper** to lek w postaci tabletek o działaniu przeciwbiegunkowym, zawierający jako substancję czynną chlorowodorek loperamidu.

### Wskazania

- Leczenie ostrej i przewlekłej biegunki u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.
- Zmniejszenie liczby i objętości stolców oraz zwiększenie ich konsystencji u pacjentów wytworzoną przetoką jelita krętego.

### Działanie

Przeciwbiegunkowe.

### Dawkowanie

Ostra biegunka

- Dorośli: początkowa dawka 2 tabletki (4 mg), a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym luźnym stolcu.
- Dzieci powyżej 6 lat: początkowa dawka 1 tabletka (2 mg), a następnie 1 tabletka (2 mg) po każdym luźnym stolcu.

Przewlekła biegunka

- Dorośli: początkowa dawka 2 tabletki (4 mg).
- Dzieci powyżej 6 lat: początkowa dawka 1 tabletka (2 mg).

### Skład

1 tabletka leku Loper zawiera:

- substancję czynną: loperamidu chlorowodorek 2 mg,
- pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia okrężnicy.
- Uczulenie na loperamidu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

#### Działania niepożądane

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- ból głowy,
- zatwardzenie,
- wzdęcia i nudności.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

- zawroty głowy,
- suchość w jamie ustnej,
- ból i dolegliwości w obrębie brzucha,
- wymioty,
- ból nadbrzusza,
- wysypka.

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- zwiększenie obwodu brzucha.

#### Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Loper należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Leczenie biegunki lekiem Loper jest leczeniem wyłącznie objawowym.
- W każdym przypadku, w którym możliwe jest ustalenie przyczyny biegunki, gdy jest to uzasadnione (lub wskazane), lekarz zaleci odpowiednie leczenie.
- Stosowanie leku Loper należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.
- U pacjentów z biegunką, szczególnie u dzieci może wystąpić odwodnienie i nadmierna utrata elektrolitów, dlatego w czasie biegunki należy przyjmować większą niż zwykle ilość płynów, aby uzupełnić te niedobory.
- Jeśli po podaniu leku w ostrej biegunce, w ciągu 48 godzin objawy nie ustąpią, należy przerwać podawanie leku Loper i skonsultować się z lekarzem.
- Pacjenci z AIDS, stosujący lek z powodu biegunki, w razie pojawienia się najwcześniejszych objawów wzdęcia brzucha powinni natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
- Opisywano pojedyncze przypadki wystąpienia toksycznego rozszerzenia okrężnicy u pacjentów z AIDS i jednoczesnym zakaźnym zapaleniem okrężnicy wywołanym zarówno przez wirusy, jak i bakterie, leczonych loperamidu chlorowodorkiem.
- Nie należy przyjmować tego produktu w celu niezgodnym z jego wskazaniem do stosowania ani w dawkach większych niż zalecane.
- U pacjentów przyjmujących zbyt duże dawki loperamidu (substancji czynnej leku Loper) notowano występowanie ciężkich zaburzeń pracy serca (m.in. przyspieszony lub nieregularny rytm serca).

#### Producent

SUN-FARM