

Loperamide Aurovitas, 2 mg, kapsułki twarde, 10 kapsułek

Cena: 4,60 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	AUROVITAS
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	Kapsułki twarde
Producent	AUROVITAS PHARMA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbiegunkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Kapsułki twarde **Loperamide Aurovitas** to lek przeciwbiegunkowy, przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia do krótkotrwałego leczenia ostrych ataków biegunki.

Wskazania

Loperamide Aurovitas podaje się w nagłych, krótkotrwałych biegunkach.

Działanie

Działanie leku Loperamide Aurovitas polega na hamowaniu pracy jelit w efekcie wydłużając czas jaki treść pokarmowa, woda i elektrolity spędzają w przewodzie pokarmowym. Kapsułki działają zapierająco i zmniejszają częstość wypróżnień.

Dawkowanie

Dawkowanie Loperamide Aurovitas u osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 2 kapsułki po pierwszym luźnym stolcu. Po każdym kolejnym luźnym wypróżnieniu należy przyjąć 1 kapsułkę. Maksymalna dawka dobową leku to 6 kapsułek. Jeśli biegunka trwa dłużej niż 48 godzin to należy skonsultować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku.

Skład

- Substancją czynną leku jest chlorowodorek loperamidu.
- 1 kapsułka twarda zawiera 2 mg chlorowodoru loperamidu.
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian. Osłonka kapsułki – korpus i wieczko: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, woda. Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172).

Przeciwwskazania

Nie stosować Loperamide Aurovitas u osób uczulonych na loperamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest również: rozdęcie okrężnicy, niedrożność jelit, uporczywy ból brzucha, wysoka

temperatura ciała, stolcom towarzyszy śluz lub krew, bakteryjne zapalenie jelita grubego i/lub cienkiego, ciężkie zapalenie jelit, przypadki, gdy tłumienie wypróżnień nie powinno mieć miejsca.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (może dotyczyć 1 na 10 osób): Ból głowy, zawroty głowy; nudności (mdłości), zaparcia, wzdęcia (wiatry).
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób): Zmęczenie, senność; bóle brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, ból w górnej części brzucha, wymioty, niestrawność i zgaga, suchość w ustach.
- Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób): Zwężenie źrenic; trudności z oddawaniem wody (mocz); zmęczenie.

Ostrzeżenia

- W przypadku pacjentów z AIDS, jeśli wystąpi obrzęk żołądka należy przerwać przyjmowanie leku.
- U osób z zaburzeniami czynności wątroby przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Loperamide Aurovitas zawiera laktozę, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Producent

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Sokratesa 13 D/27
01-909 Warszawa

Galeria

