

Luminastil, 50 mg, tabletki, 10 tabletek

Cena: 30,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	LUMINASTIL
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nasenne, Uspokajające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Luminastil to tabletki zawierające difenhydraminy chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu nasennym i uspokajającym. Produkt leczniczy przeznaczony jest dla dorosłych.

Wskazania

Produkt leczniczy Luminastil jest wskazany do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.

Działanie

Difenhydramina zaliczana jest do leków przeciwhistaminowych o działaniu nasennym i uspokajającym.

Dawkowanie

Dorośli:

- W razie potrzeby, 1 tabletka na 20 minut przed snem.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki i częstotliwości dawkowania.
- Nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki leku: 1 tabletka na dobę.
- Nie należy przyjmować dodatkowej tabletki po przebudzeniu w nocy.

Skład

- Substancją czynną leku jest difenhydraminy chlorowodorek (Difenhydramini hydrochloridum).
- Każda tabletka zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodoru (Difenhydramini hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; bliznowaciejącego wrzoda żołądka; niedrożności żołądka i jelit (spowodowana np. wrzodem trawiennym); guza chromochłonnego nadnerczy; nabytego lub wrodzonego wydłużenia odstępu QT; znanego czynnika ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym rozpoznana choroby sercowo-naczyniowej, znaczna nierównowaga elektrolitów (hipokaliemia, hipomagnezemia), stwierdzony w wywiadzie rodzinny nagły zgon z przyczyn sercowych, zmienna bradykardia, jednoczesne stosowanie z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstępn QT i (lub) wywołują częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes.

Działania niepożądane

- Często (występują u 1 do 10 osób na 100): zmęczenie, uspokojenie; senność; zaburzenia uwagi; trudności w utrzymaniu równowagi, zawroty głowy; suchość w jamie ustnej.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym nudności, wymioty; dezorientacja, paradoksalne pobudzenie (np. zwiększona energia, niepokój ruchowy, nerwowość); drgawki, bóle głowy; - parestezja (uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry); - dyskineza (nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy kończyn lub całego ciała, wyginanie i prężenie, mimowolne ruchy warg, wysuwanie i chowanie języka); niewyraźne widzenie; tachykardia (przyspieszone bicie serca), kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca); zgęstnienie wydzieliny oskrzelowej; drżenie mięśni; trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent: choruje na miastenię (objawiającą się nadmiernym osłabieniem mięśni); ma padaczkę lub zaburzenia drgawkowe; ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku); ma powiększoną prostatę lub trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu); ma astmę, zapalenie oskrzeli lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP); ma umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i (lub) ma zaburzenia świadomości (dezorientację), ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.
- W przypadku utrzymującej się bezsenności należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ objawy bezsenności mogą być oznaką innej poważnej choroby podstawowej.
- Difenhydraminę należy stosować przez najkrótszy możliwy okres czasu. Skuteczność leku Luminastil może być niższa, jeśli jest stosowany w sposób ciągły. Stosowanie leku może prowadzić do rozwoju tolerancji i/lub uzależnienia.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Galeria

