


Maglek B6, 50 tabletek



Cena: 18,28 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MAGLEK
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Niedobór minerałów
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Mag B6 to lek zawierający mleczan magnezu oraz witaminę B6. Mleczan magnezu jest łatwo przyswajalną solą magnezu, a witamina B6 pełni wiele istotnych funkcji w organizmie. Magnez i wapń współpracują w utrzymaniu zdrowych kości, a niedobór magnezu może prowadzić do różnych objawów, takich jak nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi, problemy ze snem, zwiększona podatność na stres i zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu jest również związany z ryzykiem choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu serca. Niedobór witaminy B6 może objawiać się nudnościami, wymiotami, stanami zapalnymi skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym i niedokrwistością mikrocytarną.

Wskazania

Maglek B6 stosuje się profilaktycznie w przypadku sytuacji powodujących niedobory magnezu:

- stany przewlekłego przemęczenia fizycznego i psychicznego,
- błędy żywieniowe (spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności) oraz stosowanie diet odchudzających,
- spożywanie dużej ilości kawy,
- nałogowe palenie tytoniu i spożywanie alkoholu;
- długotrwałe stosowanie leków przeczyszczających, środków antykoncepcyjnych i niektórych preparatów moczopędnych,
- diureza osmotyczna u chorych na cukrzycę w przebiegu przewlekłej hiperglikemii,

Działanie

Uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6. roku życia: 1-2 tabletki na dobę.



Skład

1 tabletkę zawiera:

- substancję czynną: mleczan magnezu 500mg, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) 5mg.
- substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Maglek B6:

- nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- hipermagnezemia o różnej etiologii,
- ciężka niewydolność nerek,
- blok przedsionkowo-komorowy serca,
- znaczne niedociśnienie tętnicze,
- produktu nie należy stosować podczas biegunki.

Ostrzeżenia

- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.