

Magne B6 Forte, 100 mg+10 mg, tabletki powlekane, 60 tabletek

Cena: 41,61 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MAGNE B6
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kołatanie serca, Skurcze, Złe samopoczucie, Zmęczenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Magne B6 Forte to lek w formie tabletek powlekanych, który wspomaga uzupełnianie niedoborów magnezu oraz witaminy B6 w organizmie. Jest odpowiedni dla dorosłych oraz dzieci od 6. roku życia i zawiera łatwo przyswajalny cytrynian magnezu.

Wskazania

Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu, które mogą objawiać się nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, łagodny lękiem, niepokojem, przejściowym uczuciem zmęczenia, ospałością, zaburzeniami snu w niewielkim nasileniu; objawami lęku, takimi jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurczami mięśni, mrowieniem, drganiem powiek.

Działanie

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Dawkowanie

- Dzieci i młodzież w wieku 6 lat lub powyżej (o masie ciała około 20 kg): od 10 do 30 mg/kg mc. na dobę (tzn. od 0,4 do 1,2 mmol/kg mc. na dobę) tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.
- Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: cytrynian magnezu (Magnesii citras) i pirydoksyny chlorowodorek (Pyridoxini hydrochloridum).
- 1 tabletkę powlekana zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i stosujących lewodopę.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.
- Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna (uczucie mrowienia).
- Lek zawiera laktozę. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 6
01-211 Warszawa
CHC.kontakt@sanofi.com

Galeria

