

Magnefar B6 Bio 60 mg + 6,06 mg, 50 tabletek

Cena: 23,86 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MAGNEFAR
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomaganie pracy mięśni, Wspomaganie układu nerwowego, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Magnefar B6 Bio to lek przeznaczony do profilaktyki i leczenia niedoborów magnezu, objawiających się m.in. drżeniem mięśni, zmęczeniem oraz drobnymi zaburzeniami snu. Zawiera łatwo przyswajalną organiczną sól magnezu w postaci cytrynianu oraz witaminę B6, która wspomaga jego wchłanianie. Lek dostępny jest w postaci tabletek powlekanych z linią podziału, co ułatwia ich rozkruszenie w przypadku trudności z połykaniem. Może być stosowany u dzieci powyżej 6 roku życia oraz u dorosłych.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka niedoboru magnezu, które mogą objawiać się: nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, odczuwaniem łagodnego lęku z towarzyszącym kołataniem serca, niepokoju, przejściowego uczucia zmęczenia, ospałością, zaburzeniami snu o niewielkim nastroju, skurczami mięśni, mrowieniem, czy drganiem powiek. Uzupełnienie niedoboru magnezu może złagodzić powyższe objawy. Kontynuowanie leczenia nie jest zalecane w przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania. Lek stosuje się u osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

Działanie

Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Jego obecność jest niezbędna w prawidłowym przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Ponadto pełni biologiczną rolę polegającą na aktywacji szeregu enzymów.

Dawkowanie

Dorośli: 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 podzielonych dawkach. Dzieci i młodzież: wiek 6-14 lat, masa ciała 21-30kg: 3 do 4 tabletek na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach; wiek 6-14 lat, masa ciała 31-39kg: 4 do 5 tabletek na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach; wiek 14-18 lat, masa ciała powyżej 40kg: 5 do 6 tabletek na dobę w 2 lub 3 podzielonych dawkach. Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając dużą ilością wody (jedna szklanka).

Skład

Substancją czynną leku są magnezu cytrynian i pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6). Jedna tabletką powlekana zawiera 60mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 6,06mg pirydoksyny chlorowodoru (Piridoxini hydrochloridum). Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Magnefar B6 Bio:

- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku,
- u osób z hipermagnezemią (zwiększonym poziomem magnezu we krwi),
- u chorych na znaczne niedociśnienie tętnicze, blok przedsionkowo-komorowy, myasthenia ravis.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- bóle brzucha
- luźne stolce albo biegunka na początku leczenia,
- zaczerwienienie skóry.

Bardzo rzadko występujące działanie niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia

- W przypadku jednoczesnego występowania niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy uzupełnić niedobory magnezu.
- Podczas ciężkich niedoborów magnezu oraz zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć pod kontrolą lekarza.
- Długotrwałe stosowanie dużych dawek magnezu może przyczyniać się do rozwoju próchnicy.
- Stosowanie większych niż zalecane może wywołać biegunkę.
- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.
- W wyniku długotrwałego stosowania magnezu może zwiększyć się stężenie potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z kontrolowanym spożyciem potasu i osłabioną czynnością nerek.
- Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy lub lat) może spowodować zaburzenia nerwów czuciowych. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, mrowienie w dłoniach i stopach a także stopniowo postępujące zaburzenia koordynacji ruchów. W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.
- Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy tymczasowo, do ustąpienia objawów, przerwać stosowanie leku lub zmniejszyć dawkę.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań