

Magnefar B6 Bio, tabletki powlekane, 60 tabletek

Cena: 27,98 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Magnefar B6 Bio to lek stosowany w profilaktyce oraz w przypadku niedoborów magnezu, które mogą objawiać się drżeniem mięśni, zmęczeniem czy drobnymi problemami ze snem. Produkt łączy dobrze przyswajalny cytrynian magnezu z witaminą B6, która wspomaga jego wchłanianie. Magnefar B6 Bio występuje w formie powlekanych tabletek z kreską dzielącą, co ułatwia ich rozkruszenie w razie trudności z połknięciem.

Wskazania

Magnefar B6 Bio stosuje się w leczeniu oraz profilaktyce niedoborów magnezu, który może objawiać się: nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju, niepokojem, przejściowym uczuciem zmęczenia, ospałością, niewielkimi zaburzeniami snu, lękiem, skurczami mięśni, mrowieniem, drżeniem powiek.

Działanie

Magnefar B6 Bio uzupełnia niedobory magnezu w organizmie. Lek zawiera jony magnezu konieczne do wielu procesów biochemicznych - kationy magnezowe są niezbędne do aktywacji szeregu enzymów. Magnez wpływa również między innymi na skurcze mięśnia sercowego oraz na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Drugi składnik aktywny Magnefar B6 Bio, czyli witamina B6 odpowiada za wchłanianie cytrynianu magnezu.

Dawkowanie

Dorośli:

- od 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku.

Dzieci i młodzież:

- 6 - 14 lat 21 - 30 kg od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku
- 31 - 39 kg od 4 do 5 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku
- 14 - 18 lat $\geq$ 40 kg od 5 do 6 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłku

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: cytrynian magnezu (Magnesii citras) oraz witamina B6, czyli chlorowodorek pirydoksyny (Pyridoxini hydrochloridum).
- Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon (typ A), kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Magnefar B6 Bio w przypadku: uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek ze składników leku, hipermagnezarii (zwiększonym poziomem magnezu we krwi); chorych na znaczne niedociśnienie tętnicze, blok przedsionkowo-komorowy, myasthenia ravis.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące rzadko: bóle brzucha, luźne stolce lub biegunka na początku leczenia (zwykle o małym nasileniu i przemijające); zaczerwienienie skóry.

Ostrzeżenia

- W przypadku jednoczesnego występowania niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy uzupełnić niedobory magnezu.
- Podczas ciężkich niedoborów magnezu oraz zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć pod kontrolą lekarza.
- Długotrwałe stosowanie dużych dawek magnezu może przyczyniać się do rozwoju próchnicy.
- Stosowanie większych niż zalecane może wywołać biegunkę.
- Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.
- W wyniku długotrwałego stosowania magnezu może zwiększyć się stężenie potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z kontrolowanym spożyciem potasu i osłabioną czynnością nerek.
- Długotrwałe stosowanie pirydoksyny (kilka miesięcy lub lat) może spowodować zaburzenia nerwów czuciowych. Objawy obejmują: drętwienie i zaburzenia poczucia pozycji, mrowienie w dłoniach i stopach a także stopniowo postępujące zaburzenia koordynacji ruchów. W większości przypadków objawy ustępują po zaprzestaniu stosowania pirydoksyny.
- Jeśli wystąpią działania niepożądane, należy tymczasowo, do ustąpienia objawów, przerwać stosowanie leku lub zmniejszyć dawkę.
- Przechowywać Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań