

Magnefar B6 Forte 100 mg + 10,10 mg, 60 tabletek powlekanych

Cena: 33,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MAGNEFAR
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomaganie pracy mięśni, Wspomaganie układu nerwowego, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Magnefar B6 Forte to lek używany w profilaktyce i leczeniu niedoborów magnezu, które mogą objawiać się m.in. drżeniem mięśni, zmęczeniem oraz drobnymi zaburzeniami snu. Zawiera wyższą dawkę dobrze przyswajalnej organicznej soli magnezu w postaci cytrynianu oraz witaminę B6, która wspiera jego wchłanianie. Produkt dostępny jest w formie tabletek powlekanych z linią podziału, co ułatwia ich rozkruszenie w przypadku trudności z połykaniem. Lek może być stosowany zarówno u dzieci powyżej 6 roku życia, jak i u dorosłych.

Wskazania

Leczenie i profilaktyka niedoboru magnezu, które mogą objawiać się:

- nerwowością, drażliwością, wahaniami nastroju,
- odczuwaniem łagodnego lęku z towarzyszącym kołataniem serca, niepokoju,
- przejściowego uczucia zmęczenia, ospałością, zaburzeniami snu o niewielkim nastroju,
- skurczami mięśni, mrowieniem, czy drganiem powiek.

Działanie

Magnez odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej. Jego obecność jest niezbędna w prawidłowym przebiegu wielu biochemicznych procesów w ustroju. Ponadto pełni biologiczną rolę polegającą na aktywacji szeregu enzymów.

Dawkowanie

- Dorośli: od 3 do 4 tabletek na dobę.
- Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat (masa ciała 21-30 kg): od 1 do 2 tabletek na dobę.
- Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat (masa ciała 31-39 kg): od 2 do 3 tabletek na dobę.
- Młodzież w wieku od 14 do 18 lat (masa ciała powyżej 40 kg): 3 do 4 tabletek na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancje czynne: 100 mg jonów magnezu w postaci magnezu cytrynianu (Magnesii citras) oraz 10,10 mg pirydoksyny chlorowodoru (Pyridoxini hydrochloridum),
- substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon (typ A), kroscarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monokaprylokapronian (typ 1), sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na cytrynian magnezu, chlorowodorek pirydoksyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Hipermagnezemia (zwiększone stężenie magnezu we krwi).
- Ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.).
- Znaczne niedociśnienie tętnicze.
- Blok przedsionkowo-komorowy.
- Choroba zwana myasthenia gravis (nabyta, przewlekła choroba, charakteryzująca się szybkim zmęczeniem i osłabieniem mięśni szkieletowych).

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- bóle brzucha
- luźne stolce albo biegunka na początku leczenia,
- zaczerwienienie skóry.

Bardzo rzadko występujące działanie niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje alergiczne.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Magnefar B6 Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku skojarzonego niedoboru magnezu i wapnia, w pierwszej kolejności należy wyrównać niedobór magnezu.
- W przypadku ciężkiego niedoboru magnezu i zaburzeń wchłaniania, leczenie należy rozpocząć pod kontrolą lekarza od dożylnego podawania magnezu.
- Lek podawany w dawce wyższej niż zalecana może powodować biegunkę.
- Długotrwałe stosowanie wysokich dawek magnezu może przyczyniać się do rozwoju próchnicy oraz zwiększyć stężenie potasu we krwi, szczególnie u pacjentów z kontrolowanym spożyciem potasu i osłabioną czynnością nerek.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań