

Magnezin, 130 mg jonów magnezowych, tabletki, 60 tabletek

Cena: 22,34 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Magnezin to lek w postaci tabletek, który zawiera magnez w formie węglanu magnezu. Jest przeznaczony dla dorosłych w celu zapobiegania niedoborom magnezu oraz w przypadkach obniżonego stężenia magnezu (hipomagnezemia). Stosowanie leku u dzieci i młodzieży jest dozwolone tylko za zgodą lekarza.

Wskazania

- Wskazaniami profilaktycznymi są: okres wzmożonego wysiłku fizycznego, przewlekłe stosowanie niektórych leków moczopędnych, długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych oraz okres kuracji odchudzających.
- Wskazaniami leczniczymi są: leczenie wspomagające zaburzeń rytmu serca, niewydolność serca z obecnymi komorowymi zaburzeniami jego rytmu, ból mięśni, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu oraz nadmierna pobudliwość nerwowa.

Działanie

Magnezin zawiera magnez, który bierze udział w wielu fizjologicznych procesach jak: mineralizacja kości, skurcz mięśni, jest elementem wielu enzymów.

Dawkowanie

W celach profilaktycznych zaleca się przyjmowanie 1 tabletkę 3 razy na dobę (łącznie 600 mg).

Skład

- Substancją czynną leku jest: magnezu węglan ciężki (Magnesii subcarbonas ponderosus).
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek z jego składników, a także jeśli u pacjenta



stwierdzono: hipermagnezemię (podwyższone stężenie magnezu we krwi), ciężką niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy, myasthenia gravis, ciśnienie tętnicze niższe niż 100/60 mm Hg lub biegunkę.

Działania niepożądane

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (u 1 do 10 na 1000 osób) zalicza się: nudności, wymioty oraz miękkie stolce.

Ostrzeżenia

- W przypadku zaburzonej czynności nerek lek Magnezin należy stosować z ostrożnością oraz regularnie poddawać się badaniom stężenia magnezu we krwi
- Dawka powyżej 2 g leku wykazuje działanie przeczyszczające.
- Jedna tabletkę zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu, co oznacza, że produkt jest "wolny od sodu".
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

GEDEON RICHTER POLSKA
ks. J. Poniańskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki