

Magnokal Asparaginian 250 mg + 250 mg tabletki 50 sztuk



Cena: 15,04 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|---|
| Dla kogo | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Opakowanie | 50 tabletek |
| Postać | Tabletka |
| Producent | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O. |
| Przeznaczenie | Niedobór minerałów |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych, Dla seniorów |

Opis produktu

Opis

Magnokal Asparaginian to preparat linky asparaginian, magnez i potas, który może być źródłem wsparcia w przypadku urzędnienia krążenia i mięśnia sercowego, a także w okresiach rekonwalescencji.

Wskazania

Niedobory magnezu, stany zmęczenia, w rekonwalescencji po chorobach zakaźnych i zabiegach chirurgicznych, zaburzenia snu i koncentracji, uzupełniająco w hipokalemii, w czasie leczenia diuretykami.

Działanie

Stymulująco na czynność mózgu. Usprawnia pamięć, poprawia koncentrację i samopoczucie, łagodzi stany zmęczenia, poprawia rytm snu.

Dawkowanie

Dorośli: doustnie, od 2 do 6 tabletek na dobę w dwóch dawkach podzielonych, po posiłkach.

Skład

1 tabletka zawiera: magnezu wodorasparaginian czterowodny 250mg, potasu wodowoasparaginian półwodny 250mg; pozostałe składniki leku to: skrobia ziemniaczana, powidon 25, magnezu staerynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Magnokal Asparaginian:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- występuje ciężka niewydolność nerek,
- zwiększone stężenie potasu lub magnezu w surowicy krwi,
- zakażenia dróg moczowych,
- zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok) serca,

- zmniejszenie częstości akcji serca (bradykardia),
- myasthenia gravis - choroba charakteryzująca się osłabieniem i zmęczeniem mięśni,
- znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Działania niepożądane

- Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności i biegunka)

Ostrzeżenia

- Leku nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała).
- Leku Magnokal Asparaginian nie należy stosować w czasie antybiotykoterapii i z innymi lekami zawierającymi potas.
- Ostrożnie stosować w razie choroby wrzodowej żołądka.
- U osób z niewydolnością nerek, przyjmujących inne preparaty potasu lub leki moczopędne oszczędzające potas należy liczyć się z koniecznością modyfikacji dawkowania zaleconą przez lekarza.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.