

MaxAlgina Teva, 500 mg, tabletki, 10 tabletek

Cena: 27,52 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	TEVA B.V.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

MaxAlgina to tabletki o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym, zawierające metamizol sodu. Stosowane u dorosłych w krótkotrwałej terapii silnego, ostrego bólu pooperacyjnego i pourazowego, a także bólowych skurczów brzucha (kolek) oraz wysokiej gorączki.

Wskazania

MaxAlginę stosuje się w: ostrych i ciężkich bólach pourazowych oraz pooperacyjnych, bolesnych kolkach, bólach nowotworowych, ostrych lub długotrwałych bólach różnego pochodzenia, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane. Wskazaniem do zastosowania jest zmniejszanie wysokiej gorączki, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Działanie

MaxAlgina działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Dawkowanie

Lek podaje się doustnie, popijając tabletki odpowiednią ilością płynu. Czas trwania leczenia i dawkowanie zależy od intensywności bólu i gorączki, a także indywidualnej reakcji pacjenta na lek, jednak nie zaleca się stosować MaxAlginy przez dłuższy okres niż od 3 do 5 dni bez konsultacji ze stomatologiem lub lekarzem. Efekt przeciwbólowy i przeciwgorączkowy występuje po 30 do minutach od podania leku. Zwykle stosowane dawkowanie MaxAlginy dla osób dorosłych to 1 do 2 tabletek co 6-8 godzin, do 4 razy dziennie. Maksymalna dawka dobową leku to 8 tabletek.

Skład

- Substancją czynną leku jest metamizol sodu jednowodny (metamizolum natrium monohydricum).
- 1 tabletkę zawiera 500 mg metamizolu sodowego jednowodnego.
- Substancje pomocnicze: skrobia żelowana, kukurydziana, makrogl 6000, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna



Przeciwwskazania

Nie stosować MaxAlginy u osób z nadwrażliwością na na metamizol sodowy jednowodny lub inne pirazolony (np. propyfenazon, fenazon), lub pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenylobutazon) (dotyczy to także pacjentów, u których po zastosowaniu tych leków wystąpiły działania niepożądane, np. agranulocytoza), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania produktu leczniczego jest także: nietolerancja na leki przeciwbólowe; zaburzenia czynności szpiku kostnego, wytwarzania krwi; genetyczny niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej; ostra przerywana porfiria wątrobowa.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera sól.
- Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku: chorób serca, zaburzeń krążenia, wysokiej gorączki, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, chorób uczuleniowych (pokrzywka, atopowe), nietolerancji niektórych barwników (tartrazyna) lub konserwantów (benzoesany).
- Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia: agranulocytozy, małopłytkowości, pancytopenii, ciężkiej choroby alergicznej.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Producent

TEVA B.V.
Swensweg 5, Holandia
Haarlem