

# Maxibiotic (5 mg + 5000 UI + 400 UI)/ g, maść, 1 g x 10 saszetek



Cena: 19,24 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MAXIBIOTIC
Opakowanie	10 saszetek po 1 g
Postać	Maść
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne)
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

## Opis produktu

### Opis

**Maxibiotic** to lek w postaci maści, który działa przeciwbakteryjnie i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w przypadku drobnych ran, owrzodzeń oraz oparzeń.

### Wskazania

Drobne rany (otarcia, zadrapania, ukąszenia), oparzenia i owrzodzenia skóry.

### Działanie

Przeciwbakteryjne.

### Dawkowanie

Oczyszczone miejsce zranienia pokryć niewielką ilością leku, miejsce to po nałożeniu leku można przykryć opatrunkiem z gazy lub pozostawić nieosłonięte. Stosować 2 do 5 razy na dobę, nie stosować dłużej niż 7 dni.

### Skład

1g maści zawiera: 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 5000 j.m. polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas) oraz 400 j.m. bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum).

Substancja pomocnicza: wazelina biała.

### Przeciwwskazania

Nie stosować leku Maxibiotic:

- jeśli pacjent ma uczulenie na neomycyny siarczan, polimyksyny B siarczan, bacytracynę cynkową lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku;

- jeśli pacjent ma zaburzenia słuchu (w takim przypadku po zastosowaniu leku może pojawić się działanie szkodliwe na słuch);
- na głębokie lub kłute rany, ciężkie oparzenia lub duże powierzchnie uszkodzonej skóry oraz na sączące zmiany chorobowe, ze względu na ryzyko

wchłonięcia substancji czynnych do krwi i wywołania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (działanie szkodliwe na słuch, nerki);

- do oczu.

#### Działania niepożądane

- Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: zakażenie niewrażliwymi szczepami bakterii lub grzybów.
- Zaburzenia układu immunologicznego: miejscowe objawy nadwrażliwości (świąd, wysypka, zaczerwienienie, obrzęk i inne objawy podrażnienia).
- Zaburzenia ucha i błędnika: uszkodzenie słuchu.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: uszkodzenia nerek.

#### Ostrzeżenia

- W przypadku silnych odczynów alergicznych należy przerwać leczenie.
- W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza objawów podrażnienia w miejscu nałożenia, lub w przypadku braku poprawy, należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego.
- Nie nakładać na duże powierzchnie skóry.
- Szczególnie ostrożnie należy stosować produkt leczniczy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z upośledzeniem słuchu.

#### Producent

Bausch Health Poland sp. z o. o.  
Przemysłowa 2  
35-959 Rzeszów