

Maxigra Go 25 mg, 4 tabletki



Cena: 22,65 zł

Opis słownikowy

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Dla kogo | Dla mężczyzn |
| Marka | MAXIGRA |
| Opakowanie | 4 tabletki |
| Postać | Tabletka |
| Producent | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A. |
| Przeznaczenie | Potencja |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty |
| Wiek | Dla dorosłych |

Opis produktu

Opis

Lek **Maxigra Go** zawiera substancję czynną syldenafil, stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Wskazania

Zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn.

Działanie

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Skład

1 tabletka powlekana Maxigra Go zawiera

- substancję czynną: syldenafil 25 mg,
- pozostałe składniki: mannitol, krospowidon typ A, powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol (MW350), talk, indygotyna, lak (E132).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego. Stosowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi chorobami serca i wątroby, niskim ciśnieniem, po niedawno przeżytym udarze lub zawale, z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa)

oraz jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często: ból głowy.
- Często: nudności; nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Ostrzeżenia

- Należy omówić zastosowanie leku jeśli u pacjenta występuje: niedokrwistość sierpowata, białaczka, szpiczak mnogi, anatomiczne zniekształcenie prącia, choroba Peyroniego, dolegliwości ze strony serca, choroba wrzodowa, zaburzenia krzepnięcia oraz zaburzenia czynności nerek i wątroby.
- W przypadku nagłego pogorszenia lub utraty wzroku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

POLPHARMA SA
Peplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

