

## Maxigra Max 50 mg, 2 tabletki powlekane



Cena: 20,76 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXIGRA
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Potencja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

### Opis produktu

#### Opis

**Maxigra Max 50 mg** to lek przeznaczony do stosowania u dorosłych mężczyzn, którzy borykają się z zaburzeniami erekcji, manifestującymi się trudnościami w osiągnięciu lub utrzymaniu wystarczająco silnej erekcji do przeprowadzenia udanego stosunku płciowego. Każda tabletki powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu, należącego do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Mechanizm działania leku opiera się na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, co sprzyja zwiększonemu przepływowi krwi podczas stymulacji seksualnej.

#### Wskazania

Leczenie zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn (impotencji).

#### Działanie

1 tabletki zawiera:

substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu),  
pozostałe składniki: rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka, koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).

#### Dawkowanie

Dawkowanie Maxigry Max u pełnoletnich mężczyzn to max. 1 tabletki powlekana na dobę.

#### Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu),

- pozostałe składniki: rdzeń tabletki: mannitol (E421), krospowidon (typ A), powidon (K30), krzemionka, koloidalna bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, sodu laurylosiarczan, otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk, lak indygotyny (E132).

### Przeciwwskazania

Nie stosować leku Maxigra Max u pacjentów z uczuleniem na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest ciężka choroba wątroby lub serca, niedawno przebyty udar albo zawał serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi, pewne rzadkie choroby oka, choroby krwi.

### Działania niepożądane

- Bardzo często występujące działania niepożądane: ból głowy.
- Często występujące działania niepożądane: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

### Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem leku należy się zapoznać z informatorem dla pacjenta.
- Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
- W przypadku występowania dolegliwości sercowych czy nieprawidłowości w budowie prącia, należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

### Producent

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pelplińska 19  
83-200 Starogard Gdański

## Galeria

