

Maxon Active 25 mg, 8 tabletek powlekanych



Cena: 39,16 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXON
Opakowanie	8 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Maxon Active to lek stosowany w leczeniu impotencji, czyli problemów z uzyskaniem lub utrzymaniem erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Przeznaczony jest dla dorosłych mężczyzn mających zaburzenia wzwodu. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu, substancji należącej do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Syldenafil zwiększa przepływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego, wspomagając rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu. Maxon Active jest skuteczny w osiągnięciu wzwodu tylko przy wcześniejszym pobudzeniu seksualnym.

Wskazania

Lek Maxon Active 25 mg stosuje się u osób dorosłych:

- w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji.

Działanie

Zwiększanie napływu krwi do prącia w czasie podniecenia seksualnego, poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: zalecana dawka leku to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.

Skład

Substancją czynną leku jest syldenafil (Sildenafilum).

1 tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, kroscarmeloza sodowa, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Opadry II31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu

cytrynian dwuwodny.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Maxon Active:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sylденаfil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego,
- jeśli pacjent przyjmuje riociguat,
- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby,
- jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego kiwi,
- jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa),
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Działania niepożądane

- Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
- Często (może występować u 1 na 10 pacjentów): nudności; nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
- Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów): ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk i nóg, krwawienie z nosa, uczucie zmęczenia.
- Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka lub powiek, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- zasięgnąć pomocy medycznej.

Producent

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Galeria





APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943