

# Maxon Forte tabletki powlekane 50 mg, 2 tabletki



Cena: 29,21 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MAXON
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletka
Producent	ADAMED PHARMA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

## Opis produktu

### Opis

**Maxon Forte 50 mg** to preparat zawierający syldenafil, substancję czynną należącą do inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Mechanizm działania leku polega na zwiększeniu przepływu krwi do prącia podczas stymulacji seksualnej poprzez rozkurcz naczyń krwionośnych w tej okolicy. W ten sposób Maxon Forte pomaga osiągnąć erekcję jedynie w przypadku wcześniejszego pobudzenia seksualnego.

### Wskazania

Lek Maxon Forte 50 mg stosuje się u osób dorosłych:

- w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji.

### Działanie

Lek zwiększa napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu.

### Dawkowanie

Dorośli mężczyźni: zalecana dawka leku to 50 mg, jeśli pacjent przyjmował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. W przeciwnym razie lek Maxon Forte w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu

### Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: 50 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu),
- rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna,

- otoczka tabletki Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

### Przeciwwskazania

- Maxon forte nie powinien być stosowany w przypadku uczulenia na substancję czynną (sildenafil) lub substancje pomocnicze.
- Przeciwwskazaniem jest również stosowanie leków z grupy azotanów, substancji uwalniających tlenek azotu (w tym tak zwanych poppersów). Leki tego typu w medycynie stosowane są do łagodzenia objawów dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej). Ich połączenie z sildenafilem może wywołać silny i niebezpieczny spadek ciśnienia tętniczego. W podobną interakcję wchodzi lek riociguat (stosowany w nadciśnieniu płucnym).
- Maxon Forte jest również przeciwwskazany w przypadku ciężkich chorób serca, wątroby, niedawnego przebytego udaru lub zawału serca, występowania niskiego ciśnienia tętniczego krwi, dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki lub jeśli u pacjenta kiedykolwiek wykryto utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

### Działania niepożądane

Bardzo często;

- ból głowy.

Często :

- nudności,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- niestrawność,
- zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia),
- uczucie zatkanego nosa,
- zawroty głowy.

Niezbyt często:

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka,
- przekrwienie oczu,
- ból oczu,
- widzenie błysków światła,
- jaskrawe widzenie,
- wrażliwość na światło,
- łzawienie oczu,

### Ostrzeżenia

- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie wzroku lub jego utrata należy natychmiast odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
- Leku nie powinno się przyjmować, jeśli zaburzenia erekcji nie występują.
- Leku Maxon Forte nie powinno się łączyć razem z innymi środkami stosowanymi w leczeniu impotencji.

### Producent

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów