

## Mel 7,5 mg, 20 tabletek

Cena: 15,90 zł



### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MEL
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

### Opis produktu

#### Opis

**Mel** to lek dostępny w postaci tabletek, które rozpuszczają się w jamie ustnej. Głównym składnikiem aktywnym jest meloksykam, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania polega na selektywnym hamowaniu cyklooksygenazy COX-2 w stosunku do COX-1. Mel jest stosowany w leczeniu bólów kostno-stawowych i mięśniowych związanych z chorobami reumatoidalnymi oraz zwyrodnieniowymi stawów. Może być również używany do krótkotrwałego łagodzenia zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa u dorosłych i młodzieży powyżej 15 roku życia.

#### Wskazania

- Bóle kostno-stawowe i mięśniowe w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.
- Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

#### Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

#### Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 15 roku życia: 1 tabletka na dobę.

#### Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: meloksykam 7,5 mg,
- substancje pomocnicze: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634, aromat waniliowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E 951), Pearlitol Flash (d-mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona), Ludiflash (octan poliwinylu, powidon K30, krospowidon (typ B), d-mannitol, woda oczyszczona), krospowidon (typ B), sodu stearylofumarany, acesulfam potasowy (E 950).

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mel:

- jeśli pacjent ma uczulenie na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
- jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka (lub) dwunastnicy,
- jeśli pacjent przeżył chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
- jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych),
- jeśli u pacjenta wystąpiły jakiegokolwiek imię krwawienia,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

### Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane

- ból głowy,
- niestrawność,
- nudności i wymioty,
- bóle brzucha,
- zaparcia.

### Ostrzeżenia

- Przyjmowanie takich leków jak Mel może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca lub udaru. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Mel należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o radę jeżeli pacjent ma podwyższone ciśnienie krwi, jest w podeszłym wieku, choruje na serce, wątrobę lub nerki.
- Lek Mel zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

### Producent

HASCO-LEK  
Żmigrodzka 242e  
Wrocław