

Mel 7,5 mg, 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Cena: 28,96 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MEL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Mel to lek o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz przeciwgorączkowym.

Wskazania

Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy stosowany w bólach kostno-stawowych i mięśniowych w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów. Stosowany: w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zeszytniające zapalenie stawów kręgosłupa.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe.

Dawkowanie

1 tabletka na dobę. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie może stosować produktu leczniczego dłużej niż przez 7 dni.

Skład

1 tabletka zawiera: substancje czynne: 7,5 mg meloksykamu (Meloxicamum) oraz substancje pomocnicze: betadeks, aromat malinowy SD0621M, aromat truskawkowy SD1634, aromat waniliowy SD1333, sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E951), Pearlitol Flash (d-mannitol, skrobia kukurydziana, woda oczyszczona), Ludiflash (octan poliwinylu, powidon K30, krospowidon (typ B), d-mannitol, woda oczyszczona), krospowidon (typ B), sodu stearylofumarany, acesulfam potasowy (E950).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancję o podobnym działaniu np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy; meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z objawami astmy,

polipami nosa, obrzękiem naczynioruchowym i pokrzywką, stwierdzanymi w następstwie podawania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ; w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią; u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat; krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie, powiązanych przyczynowo z uprzednim leczeniem NLPZ; czynnej lub nawracającej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i krwawienia w wywiadzie (dwa lub więcej oddzielnych epizodów potwierdzonego powstawania owrzodzeń lub krwawienia); ciężkiego zaburzenia czynności wątroby; ciężkiej niewydolności nerek u pacjentów niedializowanych; krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawienia w obrębie mózgu lub inne zaburzenia przebiegające z występowaniem krwawień w wywiadzie; ciężkiej niewydolności serca.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- ból głowy,
- niestrawność,
- nudności i wymioty,
- bóle brzucha,
- zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- niedokrwistość,
- reakcje alergiczne,
- zawroty głowy,
- zwiększenie ciśnienia krwi, nagłe zaczerwienienia twarzy,
- krwawienia z przewodu pokarmowego,
- zaburzenia czynności wątroby,
- obrzęk naczynioruchowy,
- świąt, wysypka,
- obrzęk, w tym obrzęk kończyn dolnych.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 100 na 10000 osób):

- zaburzenia w morfologii krwi,
- zaburzenia nastroju, koszmary senne,
- zaburzenia widzenia, z nieostрым widzeniem włącznie, zapalenie spojówek,
- szumy uszne,
- kołatanie serca,
- owrzodzenie żołądka.

Częstość nieznana:

- reakcje anafilaktyczne,
- splątanie, dezorientacja,
- zapalenie trzustki,
- nadwrażliwość na światło.

Ostrzeżenia

- Przyjmowanie takich leków jak Mel może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca lub udaru. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Mel należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o radę jeżeli pacjent ma podwyższone ciśnienie krwi, jest w podeszłym wieku, choruje na serce, wątrobę lub nerki.
- Lek Mel zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław