

Mel Max Actigel 20 mg/g, żel, 100 g

Cena: 40,48 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MEL MAX ACTIGEL
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Chłodzące, Łagodzące (kojące), Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Mel Max Actigel to żel przeciwbólowy i przeciwzapalny zawierający diklofenak, przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe. Diklofenak jest substancją czynną należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa skutecznie przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwozrękowo.

Wskazania

Ból, stany zapalne i obrzęki występujące w okolicach mięśni i stawów.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwozrękowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: lek działa przeciwbólowo do 12 godzin.

Skład

1 g żelu zawiera:

- substancja czynna: 20 mg diklofenaku sodowego,
- pozostałe składniki (substancje pomocnicze): alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła, kokozylokaprylokapronian, kopolimer akryloilodimetylotaurynianu amonu i Nwinylopirolidonu, makrogolu eter cetostearylowy, sorbitanu trioleinian, kompozycja zapachowa Doven KD1710/L (zawiera między innymi: aldehyd heksylocynamonowy, alkohol benzylowy, benzoesan benzyli, cytronellol, eugenol, kumarynę, linalol, salicylan benzyli oraz 3-metylo-4-

(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Objawy reakcji alergicznej, wywołane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne takie jak: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar).
- Trzeci trymestr ciąży.
- Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

- Rzadko (występują u mniej niż 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): wysypka skórna z pęcherzykami.
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek): sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma), obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani, pokrzywka.

Inne działania niepożądane.

- Często (występują u mniej niż 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry).
- Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób stosujących lek): wysypka grudkowata, zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować leku na otwarte rany, uszkodzoną skórę, wypryski. W przypadku wystąpienia wysypki skórnej, należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie należy stosować żelu na duże powierzchnie ciała ani długotrwale.
- Lek Mel Max Actigel jest przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę. Nie stosować na błony śluzowe (np. w jamie ustnej) i należy unikać kontaktu z oczami.
- Lek może być stosowany jednocześnie z bandażami lub opatrunkami zwykle stosowanymi w przypadku skręceń, jednak nie należy stosować go pod opatrunki uniemożliwiające dostęp powietrza.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław

Galeria

