

Melatonina Lek-AM, 5 mg, tabletki, 60 tabletek

Cena: 61,75 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDS. FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Bezsenność, Sen
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Melatonina LEK-AM to syntetyczny odpowiednik naturalnego hormonu, który jest wytwarzany w organizmie przez szyszynkę. Hormon ten odgrywa kluczową rolę w regulacji rytmu snu i czuwania w ciągu doby. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Wskazania

Lek Melatonina LEK-AM stosowany jest wspomagająco w zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową oraz zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych.

Działanie

Melatonina jest hormonem, który pełni rolę w regulacji godzin snu i czuwania w ciągu doby.

Dawkowanie

Dorośli:

- W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych: 2 mg do 3 mg melatoniny raz na dobę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2 do 3 kolejnych dni po zakończeniu podróży.
- W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na dobę na godzinę przed snem.
- W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę, około godziny 21:00-22:00. Dawkowanie to dotyczy też długotrwałego przyjmowania leku.

Skład

- Substancją czynną jest melatonina (Melatoninum).
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna 102, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancje czynną lub którykolwiek składnik produktu oraz po spożyciu alkoholu.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania melatoniny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek, depresją, padaczką oraz zaburzeniami hormonalnymi i układu odpornościowego.
- Palenie papierosów może zmniejszać stężenie melatoniny.
- Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

LEK-AM
Ostrzykowitzna 14A
Zakroczym

Galeria

