

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania, żucia, 2 sztuki



Cena: 23,99 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MENSIL
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Erekcja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Mensil to lek przeznaczony do leczenia zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.

Wskazania

- Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
- W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna.

Działanie

Mensil zawiera substancję czynną sylденаfil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sylденаfil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Mensil to 25 mg.

Skład

- Substancją czynną leku jest sylденаfil (Sildenafilum).
- Jedna tabletkę leku zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).
- Substancje pomocnicze to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroscarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Mensil:

- jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje azotany lub leki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi,
- w przypadku ciężkich chorób serca lub wątroby,
- po niedawno przeżytym udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

Działania niepożądane

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

- nudności, zawroty głowy,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- niestrawność
- widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,
- bóle mięśni,
- senność, osłabione czucie dotyku,
- dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej,
- zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha,
- krew w moczu,
- ból rąk lub nóg,
- krwawienie z nosa,
- uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

- omdlenia,
- udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
- krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
- krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
- suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości
- nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera aspartam oraz laktozę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.

Producent

HASCO-LEK



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Żmigrodzka 242e
Wrocław