

Mensil, 25 mg, tabletki do rozgryzania, żucia, 8 tabletek



Cena: 39,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MENSIL
Opakowanie	8 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Erekcja
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Mensil to tabletki do żucia stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji, polegającej na niemożności uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Mensil wspomaga rozkurcz naczyń krwionośnych w prąciu, co zwiększa napływ krwi podczas podniecenia seksualnego.

Wskazania

- Produkt leczniczy Mensil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
- W celu skutecznego działania produktu leczniczego Mensil niezbędna jest stymulacja seksualna.

Działanie

Mensil zawiera substancję czynną sildenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Mensil to 25 mg, czyli 1 tabletkę, którą należy rozgryźć lub żuć na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę i nie wymaga on popijania.

Skład

- Substancją czynną leku jest sildenafil.
- Jedna tabletkę leku zawiera 25 mg sildenafilu (w postaci cytrynianu).



- Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Mensil u pacjentów z uczuleniem na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku są ciężkie choroby serca lub wątroby, niskie ciśnienie tętnicze krwi oraz niedawno przebyty udar czy zawał serca.

Działania niepożądane

- Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy
- Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, zawroty głowy; nagłe zaczerwienienie twarzy; uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała); niestrawność; widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa.
- Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty; wysypka skórna; podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu; kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie; bóle mięśni; senność, osłabione czucie dotyku; dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej; zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha; krew w moczu; ból rąk lub nóg; krwawienie z nosa; uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
- Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia; udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu; uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust; krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódok wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka; krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie; suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości; nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław