

Mensil Max 50 mg, 2 tabletki do żucia



Cena: 22,89 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Marka	MENSIL
Opakowanie	2 tabletki
Postać	Tabletki do żucia
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające sprawność seksualną, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Mensil Max 50 mg to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, stosowany w celu poprawy erekcji u mężczyzn z zaburzeniami wzwodu. Substancją czynną jest syldenafil, który należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek Mensil pomaga w rozszerzeniu naczyń krwionośnych prącia, co sprzyja zwiększonemu przepływowi krwi podczas stymulacji seksualnej. Istotne jest, że aby osiągnąć korzystne efekty leczenia syldenafilu, niezbędne jest wystąpienie pobudzenia seksualnego.

Wskazania

Lek Mensil 50 mg stosuje się:

- w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej.

Działanie

Lek Mensil Max działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka to 50 mg, o ile pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej.

Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: syldenafil (w postaci cytrynianu) 50 mg,
- substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroscarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do

ustalenia pH).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Przyjmowanie leków uwalniających tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
- Przyjmowanie riocyguatu. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
- Ciężkie choroby serca lub wątroby.
- Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
- Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

Działania niepożądane

- Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy
- Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, zawroty głowy; nagłe zaczerwienienie twarzy; uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała); niestrawność; widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa.
- Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty; wysypka skórna; podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu; kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie; bóle mięśni; senność, osłabione czucie dotyku; dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej; zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha; krew w moczu; ból rąk lub nóg; krwawienie z nosa; uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
- Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia; udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu; uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust; krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka; krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie; suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości; nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Ostrzeżenia

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- zasięgnąć pomocy medycznej.

Producent

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Żmigrońska 242 E
51-131 Wrocław