

Metafen Dexketoprofen, 25 mg, tabletki powlekane, 20 tabletek

Cena: 20,46 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	METAFEN
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Metafen Dexketoprofen to lek przeciwbólowy z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), stosowany do objawowego leczenia łagodnego i umiarkowanego bólu u dorosłych.

Wskazania

Metafen Dexketoprofen stosowany jest w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takim jak ból mięśni, bolesne miesiączkowanie, ból zębów.

Działanie

Deksketoprofen z trometamolem jest lekiem przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Dawkowanie

Dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg (pół tabletki) co 4 do 6 godzin lub 25 mg (1 tabletki) co 8 godzin. Nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 75 mg (3 tabletki). Tabletki można podzielić na równe dawki.

Skład

- Substancją czynną jest deksketoprofen (Dexketoprofenum).
- Każda tabletki zawiera 25 mg deksketopropenu (Dexketoprofenum) w postaci deksketopropenu z trometamolem.
- Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), glicerolu

distearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol/PEG 400.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na deksketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników oraz na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Stosowanie jest przeciwwskazane w przypadku występowania u pacjenta reakcji nadwrażliwości po podaniu leków z grupy NLPZ, reakcji fototoksycznych lub fotoalergicznym podczas stosowania ketoprofenu. Choroby i stany wykluczające zastosowanie: choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z żołądka lub jelit (aktywne lub w przeszłości), przewlekłe zaburzenia trawienne (np. niestrawność, zgaga), choroby jelit przebiegające z przewlekłym stanem zapalnym (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego), ciężka niewydolność serca, umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby, skłonność do krwawień lub zaburzenia krzepnięcia, odwodnienie.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób): nudności i (lub) wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność (dyspepsja).
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób): uczucie wirowania, zawroty głowy, senność, zaburzenia snu, nerwowość, bóle głowy, kołatanie serca, zaczerwienienie twarzy, choroby żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem gazów, wysypka, zmęczenie, ból, odczuwanie gorączki i dreszczy, złe samopoczucie.
- Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób): choroba wrzodowa żołądka, krwawienie lub perforacja wrzodu trawiennego (które może objawiać się krwawymi wymiotami lub czarnymi stolcami), omdlenia, nadciśnienie tętnicze, zwolnienie częstości oddechów, gromadzenie wody w kończynach i obrzęki obwodowe (np. spuchnięte kostki), obrzęk krtani, utrata apetytu (jadłowstręt), nieprawidłowe czucie, swędząca wysypka, trądzik, zwiększona potliwość, ból pleców, zwiększone oddawanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia gruczołu krokowego, nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby (testy krwi), uszkodzenie komórek wątroby (zapalenie wątroby), ostra niewydolność nerek.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób): reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości, które mogą prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego), owrzodzenie skóry, warg, oczu i okolic narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella), obrzęk twarzy lub obrzęk warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy), duszność spowodowana skurczem mięśni oddechowych (skurcz oskrzeli), krótki oddech, przyspieszony rytm serca, obniżone ciśnienie krwi, zapalenie trzustki, nieostre widzenie, szumy uszne, reakcje nadwrażliwości skóry i nadwrażliwość skóry na światło, świąd, choroby nerek, zmniejszona liczba białych krwinek (neutropenia), zmniejszona liczba płytek krwi (małopłytkowość).

Ostrzeżenia

- Metafen Dexketoprofen należy podawać ostrożnie pacjentom z alergią w wywiadzie, w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Producent

POLPHARMA SA
Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria



LEK

Szybko działa na ostry ból
– już po 30 min.



25 mg tabletek powlekanych Deksketoprofenu
lek przeciwbólowy przeciwzapalny przeciwgorączkowy tylko dla dorosłych

LEK

Na ostry ból m.in.:

- ból w układzie mięśniowym i kostno-stawowym
- ból zębów
- bolesne miesiączkowanie

LEK

MOŻNA ZAŻYWAĆ NA CZCZO¹



Przyjmowanie leku na pusty żołądek (min. 30 min przed posiłkiem) powoduje szybsze wchłanianie leku i jego szybszy początek działania.

¹ChPL Metafen Deksketoprofen

LEK

NOWOCZESNY LEK NA OSTRY BÓL

★★★★★
4,5/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo*

95% 94%

szybkość działania wydajność

* średnia z 12 opinii dostępnych w serwisie Ceneo.pl, stan na dzień 14.09.2022. Źródło: <https://www.ceneo.pl/106783706#tab=reviews>