

Metafen Rozkurczowy, 40 mg, tabletki, 20 tabletek



Cena: 17,32 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	METAFEN
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Rozkurczające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Metafen Rozkurczowy to lek zawierający drotawerynę, która działa rozkurczowo na mięśnie gładkie. Stosowany jest w stanach skurczowych związanych z chorobami układu pokarmowego i moczowo-płciowego oraz w przypadku bolesnego miesiączkowania.

Wskazania

Metafen Rozkurczowy stosuje się w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami: dróg żółciowych (kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego); dróg moczowych (kamica nerkowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz).

Wspomagająco jest wykorzystywany w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, w zespole drażliwego jelita grubego, w zaparciach spastycznych i wzdęciach jelit oraz w bolesnym miesiączkowaniu.

Działanie

Substancja czynna leku - drotaweryna jest syntetyczną pochodną papaweryny. Lek wykazuje działanie rozkurczowe (spazmolityczne) na mięśnie gładkie. Działanie leku szczególnie wyraźnie zaznacza się w stanach skurczowych w obrębie jamy brzusznej, dróg żółciowych, układu moczowego, przewodu pokarmowego oraz układu krążenia.

Dawkowanie

Dorośli: 120 mg do 240 mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg.

Dzieci:

W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego Metafen rozkurczowy u dzieci:

- dawka dobową dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg, w 2 dawkach podzielonych
- dawka dobową dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2-4 dawkach podzielonych.

Skład

- Substancją czynną jest drotaweryny chlorowodorek (Drotaverini hydrochloridum).
- Każda tabletką zawiera 40 mg chlorowodoru drotaweryny.
- Substancje pomocnicze: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek składnik preparatu oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek i blokiem przedsionkowo-komorowym II-III stopnia.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 osoby na 1000): bóle i zawroty głowy, bezsenność, po dużych dawkach senność, osłabienie, obniżenie ciśnienia krwi, kołatanie serca, nudności, utrata łaknienia, zaparcie, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): krwawienie poporodowe.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Metafen Rozkurczowy: u pacjentów z porfirią; z niedociśnieniem; u dzieci, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących działania drotaweryny w tej grupie; u kobiet w ciąży.
- Nie należy stosować drotaweryny w okresie porodu.
- Lek należy przechowywać w miejscu suchym, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

POLPHARMA SA
Pełplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

