

Metafen, tabletki, 10 tabletek

Cena: 14,54 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	METAFEN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Metafen to lek zawierający ibuprofen i paracetamol.

Wskazania

Lek Metafen stosuje się w bólach różnego pochodzenia takich jak bóle głowy, migrena, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, bóle kości i stawów, bóle pourazowe.

Działanie

Paracetamol i ibuprofen wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwwgorączkowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę.

Skład

- Substancje czynne leku to ibuprofen (Ibuprofenum) i paracetamol (Paracetamolum).
- 1 tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.
- Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Metafen: jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku, w ciężkiej niewydolności nerek i

(lub) wątroby, w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy; perforacji lub krwawień, w ciężkiej niewydolności serca, w czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej, w przypadku zatrzymania moczu, w przypadku choroby alkoholowej.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, dolegliwości żołądkowe, wymioty.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): wzdęcia, zaparcia, wrzód trawienny, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzodzące zapalenie jamy ustnej, ból głowy zawroty głowy, wysypki różnego typu, w tym pokrzywka i świąd.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): bezsenność, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10000 osób): zaburzenie wskaźników morfologii krwi, nieprawidłowa czynność wątroby, rumień wielopostaciowy, splątanie, depresja i omamy, zaburzenia widzenia, szumy uszne i zawroty głowy, nadmierna potliwość, plamica i nadwrażliwość na światło, obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.
- Częstość nieznana: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych.

Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub jednoczesne zażywanie leków przeciwzakrzepowych, z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, z chorobami przewodu pokarmowego.
- Lek należy stosować ostrożnie u osób z astmą oskrzelową oraz u osób, u których występują lub w przeszłości występowały inne reakcje uczuleniowe, ze względu na ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli.
- U pacjentów w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

POLPHARMA S.A.
Pelplińska 19
Starogard Gdański