

# Metafen, tabletki, 20 tabletek

Cena: 22,85 zł



## Opis słownikowy

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn                   |
| Marka           | METAFEN                                    |
| Opakowanie      | 20 tabletek                                |
| Postać          | Tabletki                                   |
| Producent       | ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.        |
| Przeznaczenie   | Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe           |
| Rodzaj produktu | Lek bez recepty                            |
| Wiek            | Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów |

## Opis produktu

### Opis

**Metafen** to lek, który zawiera ibuprofen i paracetamol.

### Wskazania

Lek Metafen stosuje się w bólach różnego pochodzenia takich jak bóle głowy, migrena, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, bóle kości i stawów, bóle pourazowe.

### Działanie

Paracetamol i ibuprofen wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

### Dawkowanie

- Dorośli: jednorazowo 1 lub 2 tabletki.
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1 tabletkę.

### Skład

- Substancje czynne leku to ibuprofen (Ibuprofenum) i paracetamol (Paracetamolum).
- 1 tabletkę zawiera 200 mg ibuprofenu i 325 mg paracetamolu.
- Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku Metafen: jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników leku, w ciężkiej niewydolności nerek i (lub) wątroby, w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy; perforacji lub krwawień, w ciężkiej niewydolności serca, w czasie jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych oraz w skazie krwotocznej, w przypadku zatrzymania moczu, w

przypadku choroby alkoholowej.

### Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, dolegliwości żołądkowe, wymioty.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): wzdęcia, zaparcia, wrzód trawiennych, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, ból głowy zawroty głowy, wysypki różnego typu, w tym pokrzywka i świąd.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 osób): bezsenność, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż u 1 na 10000 osób): zaburzenie wskaźników morfologii krwi, nieprawidłowa czynność wątroby, rumień wielopostaciowy, splątanie, depresja i omamy, zaburzenia widzenia, szumy uszne i zawroty głowy, nadmierna potliwość, plamica i nadwrażliwość na światło, obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.
- Częstość nieznana: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych.

### Ostrzeżenia

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub jednoczesne zażywanie leków przeciwzakrzepowych, z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, z chorobami przewodu pokarmowego.
- Lek należy stosować ostrożnie u osób z astmą oskrzelową oraz u osób, u których występują lub w przeszłości występowały inne reakcje uczuleniowe, ze względu na ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli.
- U pacjentów w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem i wilgocią, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Producent

POLPHARMA S.A.  
Pełplińska 19  
Starogard Gdański

## Galeria

