

Metafen Zatoki, 200mg+30mg, tabletki powlekane, 20 tabletek

Cena: 26,17 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe, Przeciwzapalne, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Metafen Zatoki to lek zawierający ibuprofen oraz pseudoefedrynę, stosowany w łagodzeniu objawów towarzyszących zapaleniu zatok. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i udrażniająco, przynosząc ulgę w przypadku bólu zatok, obrzęku błon śluzowych oraz uczucia zatkania nosa.

Wskazania

Lek Metafen Zatoki stosuje się w celu leczenia objawowych dolegliwości związanych z chorobami zatok.

Działanie

Składniki preparatu Metafen Zatoki działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz zmniejszają przekrwienie błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

- U dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat zwykle stosuje się: dawka początkowa - 2 tabletki, następnie w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 godziny w ciągu doby.
- Osoby w wieku powyżej 65 lat: nie jest konieczna modyfikacja dawki, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby, wtedy dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są ibuprofen (Ibuprofenum) i chlorowodorek pseudoefedryny (Pseudoephedrinii hydrochloridum).
- 1 tabletki zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodoru.

- Substancje pomocnicze: powidon, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna z krzemionką koloidalną bezwodną, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), mannitol, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metafen Zatoki:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy: występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ,
- w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby,
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, perforacji lub krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZ,
- w przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, jaskry, nadczynności tarczycy, rozrostu gruczołu krokowego, guza chromochłonnego, polipów nosa,
- w przypadku ciężkiej choroby układu sercowo-naczyniowego, tachycardii, dławicy piersiowej,
- w ciężkiej niewydolności serca,
- w przypadku krwotocznego udaru mózgu w wywiadzie lub występowania czynników ryzyka, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- w przypadku skazy krwotocznej oraz przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.

Działania niepożądane

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- niestrawność, ból brzucha, nudności,
- bóle głowy,
- pokrzywka i świąd.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,
- obrzęki.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

- zaburzenia wskaźników morfologii krwi,
- zaburzenia czynności wątroby,
- rumień wielopostaciowy,
- smółkowe stolce, krwawe wymioty,
- ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani.

Ostrzeżenia

- Zachować szczególną ostrożność u pacjentów z cukrzycą, ze zwężeniem odźwiernika, z niedrożnością szyi pęcherza moczowego.
- U osób w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych.
- Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia.
- Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić u sportowców dodatni wynik testów na przyjmowanie substancji dopingowych.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

POLPHARMA S.A.
Pełplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Galeria

