

# MIG 400 mg, 20 tabletek

Cena: 15,99 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MIG
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	BERLIN-CHEMIE AG
Przeznaczenie	Ból, Gorączka, Stan zapalny
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

## Opis produktu

### Opis

MIG 400 mg to lek zawierający substancję czynną ibuprofen, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jest on stosowany w celu łagodzenia bólu różnego pochodzenia, redukcji gorączki oraz łagodzenia stanów zapalnych. Jest przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6 roku życia. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności enzymów COX (cyklooksygenaz), które uczestniczą w produkcji prostaglandyn – substancji biorących udział w procesach zapalnych, bólu i gorączce. Poprzez blokowanie tych enzymów, ibuprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo.

### Wskazania

- w bólach różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (ból towarzyszący przeziębieniu i grypie, bóle zębów, stawów, kości i mięśni, nerwo bóle, bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena),
- w gorączce o różnym pochodzeniu (m.in. w przypadku gorączki występującej w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób zakaźnych),

### Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku 6-9 lat: jednorazowo 0,5 tabletki. Nie należy stosować więcej niż 1,5 tabletki w ciągu doby.
- Dzieci w wieku 10-12 lat: jednorazowo 0,5 tabletki. Nie należy stosować więcej niż 2 tabletki w ciągu doby.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 0,5-1 tabletki. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki w ciągu doby.

### Skład

1 tabletką zawiera:

- substancję czynną: ibuprofen 400 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian, hypromeloza 6 mPas, makrogol 4000, powidon K30, tytanu dwutlenek (E171).

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub jakikolwiek inny składnik leku.
- Uczulenie lub reakcje alergiczne zaobserwowane w przeszłości po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ, takie jak nieżyt błony śluzowej nosa, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa.
- Czynna lub wcześniej występująca choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie (dwukrotne lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
- Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym przyjmowaniem NLPZ.
- Ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby.
- Skaza krwotoczna.
- Trzeci trymestr ciąży.
- Brak zalecenia dla pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg.

### Działania niepożądane

- zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty,
- wzdęcia, biegunka, zaparcia.
- reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem oraz napadami astmy,
- ból głowy, zawroty głowy, zamroczenie, nadmierne pobudzenie, drażliwość, zmęczenie,
- zawroty głowy, ból głowy, zamroczenie, drażliwość, zmęczenie,

### Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### Ostrzeżenia

- Należy unikać stosowania leku MIG z innymi lekami z grupy NLPZ.
- U osób w podeszłym wieku częstość występowania niektórych działań niepożądanych jest inna.
- Ryzyko choroby wrzodowej, krwawienia z przewodu pokarmowego zwiększa się wraz z zażywaną dawką.
- Ibuprofen zawarty w leku posiada również działanie przeciwzakrzepowe (hamuje czasowo czynność płytek krwi). Zachować ostrożność stosując u osób z zaburzeniami krzepnięcia.
- Nie należy stosować leku z ospie wietrznej.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.