

MIG dla dzieci Forte 40 mg/ml, zawiesina doustna od 1 roku, smak truskawkowy, 100 ml

Cena: 27,43 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	MIG
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Zawiesina
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

MIG dla dzieci Forte to zawiesina doustna o smaku truskawkowym, przeznaczona do krótkotrwałego leczenia gorączki i bólu o łagodnym do umiarkowanego nasileniu. Może być stosowana u dzieci od 1. roku życia (o masie ciała od 10 kg), młodzieży i dorosłych. Substancją czynną jest ibuprofen, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna z podziałką od 0,25 ml do 5 ml, wykonana z polipropylenu, umożliwiającą precyzyjne dawkowanie.

Wskazania

- Gorączka,
- Ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku 1-3 lata (10-15 kg): dawka jednorazowa 2,5 ml zawiesiny (100 mg ibuprofenu), całkowita dawka dobową 7,5 ml zawiesiny (300 mg).
- Dzieci w wieku 4-5 lat (16-19 kg): dawka jednorazowa 3,75 ml zawiesiny (150 mg ibuprofenu), całkowita dawka dobową 11,25 ml zawiesiny (450 mg).
- Dzieci w wieku 6-9 lat (20-29 kg): dawka jednorazowa 5 ml zawiesiny (200 mg ibuprofenu), całkowita dawka dobową 15 ml

zawiesiny (600 mg).

- Dzieci w wieku 10-11 lat (30-39 kg): dawka jednorazowa 5 ml zawiesiny (200 mg ibuprofenu), całkowita dawka dobową 20 ml zawiesiny (800 mg).
- Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli (40 kg i powyżej): dawka jednorazowa 5-10 ml zawiesiny (200-400 mg ibuprofenu), całkowita dawka dobową 30 ml zawiesiny (1200 mg).

Skład

1 ml zawiesiny zawiera:

- substancję czynną: 40 mg ibuprofenu,
- substancje pomocnicze: benzoetan sodu (E211), bezwodny kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sacharyna sodowa, chlorek sodu, hypromeloza 15cP, guma ksantanowa, maltitol ciekły, glicerol (E422), taumatyna (E957), aromat truskawkowy (naturalne preparaty smakowe, maltodekstryna, cytrynian trietylu (E1505), glikol propylenowy (E1520) i alkohol benzylowy), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, jeśli:

- pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa (nieżyt nosa), obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne (pokrzywka) w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
- u pacjenta występują zaburzenia krwiotworzenia o niewyjaśnionej przyczynie,
- u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z uprzednio stosowanymi NLPZ,
- u pacjenta stwierdza się czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),
- u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
- pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów),

pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia.

Niezbym często występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- wrzody żołądka lub jelita, niekiedy z krwawieniem i perforacją,
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z powstaniem owrzodzeń, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, drażliwość, zmęczenie,
- reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i swędzeniem, a także napady astmy oskrzelowej.

Rzadko występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- kołatanie serca (palpitacje), niewydolność serca,
- zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki,
- zmniejszenie ilości moczu wytwarzanego przez nerki i nagromadzenie się płynów w organizmie (obrzęki),
- zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, małopłytkowość).

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy.
- Należy unikać jednoczesnego stosowania leku MIG dla dzieci Forte i innych NLPZ.
- Pacjenci w podeszłym wieku narażeni są na występowania ze zwiększoną częstością działań niepożądanych podczas stosowania NLPZ.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa