

Minovivax 5%, 50 mg/ml, roztwór na skórę, 100 ml



Cena: 83,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla mężczyzn
Opakowanie	1 butelka po 100 ml
Postać	Roztwór
Producent	ARISTO PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łysienie
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Minovivax to lek w formie roztworu do stosowania na skórę, który pobudza wzrost włosów. Jest używany do leczenia łysienia androgenowego.

Wskazania

Lek Minovivax jest stosowany w łysieniu androgenowym u mężczyzn.

Działanie

Minovivax pobudza wzrost włosów u pewnej grupy pacjentów z łysieniem androgenowym.

Dawkowanie

Zalecana dawka dobową to 1 ml roztworu. Dawka dobową nie powinna przekraczać 2 ml roztworu niezależnie od leczonej powierzchni skóry.

Skład

- Substancją czynną jest minoksydyl (Minoxidilum).
- 1 ml roztworu na skórę zawiera 50 mg minoksydylu (Minoxidilum).
- Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol 96%.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Minovivax w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): ból głowy.
- Działania niepożądane występujące często (może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): duszność, świąd, nadmierne



owłosienie (w przypadku kobiet także na twarzy), zapalenie skóry, wysypka trądzikopodobna, wysypka, obrzęk obwodowy, zwiększenie masy ciała.

Ostrzeżenia

- Należy poinformować lekarza i zachować ostrożność, jeśli: przyczyna wypadania włosów nie jest znana; pacjent stosuje opatrunki okluzyjne; na skórze głowy występuje stan zapalny, łuszczyca lub jeśli pacjent ma ogoloną skórę głowy; pacjent ma jakąkolwiek chorobę naczyń krwionośnych lub serca.
- W przypadku wystąpienia niedociśnienia lub bólu w klatce piersiowej, szybkiej akcji serca, omdlenia lub zawrotów głowy, nagłego, niewyjaśnionego zwiększenia masy ciała, obrzęku dłoni lub stóp albo utrzymującego się zaczerwienienia lub podrażnienia skóry głowy. Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nie wystawiać leczonej skóry głowy na słońce: należy nosić nakrycie głowy (kapelusz).
- Lek zawiera etanol (alkohol).
- U niektórych pacjentów wystąpiły zmiany koloru włosów i/lub ich tekstury.
- W razie kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, miejsca te należy obficie przepłukać wodą. W razie konieczności, należy skontaktować się z okulistą.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Aristo Pharma Sp. z o.o.
Baletowa 30
02-867 Warszawa