

Mobilat (0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g, żel, 100 g

Cena: 42,55 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	STADA ARZNEIMITTEL AG
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Mobilat to żel leczniczy stosowany miejscowo do leczenia pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiałków. Jest również skuteczny w łagodzeniu bólu podczas ruchu oraz w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

Wskazania

- Leczenie pourazowych stanów zapalnych stawów i krwiałków.
- Leczenie bólów występujących podczas ruchu i w stanach przeciążeniowych mięśni i ścięgien.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy nakładać pasek żelu o długości od 5 do 15 cm na zmienione chorobowo miejsca 1 lub 3 razy na dobę.

Skład

100 g żelu zawiera:

- substancje czynne: mukopolisacharydowy polisiarczan 0,2 g, ekstrakt z kory nadnerczy 1 g, kwas salicylowy 2 g,
- substancje pomocnicze: disodu edetynian, olejek rozmarynowy, etanoloamina, karbomer, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Mobilat jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników. Nie stosować leku jeśli pacjent choruje na: ospę wietrzną, reakcje poszczepienne, grzybicze lub bakteryjne zakażenia skóry albo inne swoiste zmiany skórne w obszarze podawania leku (np. zmiany grucznicze, kiła). Lek przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci w wieku



powyżej 12 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 1000):

- miejscowe podrażnienia skóry.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 osoby na 10 000):

- uczulenia kontaktowe.

Ostrzeżenia

- Przed rozpoczęciem stosowania leku Mobilat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Żel powinien być stosowany jedynie na nieuszkodzoną skórę.
- Należy unikać kontaktu żelu Mobilat z otwartymi ranami, oczami i błonami śluzowymi.
- W związku ze sposobem podawania leku przedawkowanie jest mało prawdopodobne.
- Możliwe jest zatrucie salicylanami w przypadku przypadkowego połknięcia leku; objawami zatrucia są wymioty, nasilone pocenie się, tachykardia (częstoskurcz, czyli przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę), hiperwentylacja (zbyt głębokie i intensywne oddychanie), gorączka, szumy uszne, zaburzenia świadomości, zasadowica oddechowa i zasadowy odczyn moczu.
- W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Mobilat® należy skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia objawów przedawkowania lekarz zastosuje właściwe leczenie objawowe.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Producent

STADA
Al. 3 Maja 6
Piaseczno