

Moilec 7,5 mg Tabletki 10 sztuk

Cena: 8,76 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 16 lat

Opis produktu

Opis

Lek **Moilec** jest wskazany do stosowania w przypadku bólów kostno-stawowych i mięśniowych związanych z chorobami reumatoidalnymi oraz zwyrodnieniowymi stawów. Przeznaczony jest także do krótkotrwałego leczenia zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów oraz zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Może być stosowany u dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia.

Wskazania

- Bóle kostno-stawowe i mięśniowe w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.
- Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów oraz zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 16 roku życia: 1 tabletka na dobę.

Skład

1 tabletka zawiera:

- substancję czynną: meloksykam 7,5 mg,
- substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu cytrynian, krospowidon.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek z jego składników, na aspirynę oraz inne leki z grupy NLPZ lub jeśli

po ich zastosowaniu pojawiły się: świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność (astma), niedrożność nosa z powodu obrzęku błony śluzowej nosa (polipy nosa), wysypka skórna (pokrzywka), nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych np. obrzęk wokół oczu, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, mogący ewentualnie utrudniać oddychanie (obrzęk naczynioruchowy), Nie podawać leku pacjentom u których stwierdzono chorobę wrzodową lub krwawienie z żołądka lub jelit, jeśli wcześniej pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub jelit lub wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, jeśli stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby, ostatnio wystąpiły krwawienia w obrębie mózgu lub jakiegokolwiek inne krwawienia lub jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca.

Nie stosować u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek.

Lek zawiera laktozę, nie stosować jeśli pacjent posiada nietolerancję niektórych cukrów.

Działania niepożądane

- Zawroty głowy (uczucie pustki w głowie),
- Zawroty głowy lub uczucie wirowania (pochodzenia błędnikowego),
- Senność (ospałość),
- Niedokrwistość, wzrost ciśnienia krwi, zaczerwienienie twarzy,
- Zatrzymanie sodu i wody, zwiększone stężenie potasu,
- Odbijanie się, zapalenie żołądka,
- Krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
- Natychmiastowe reakcje uczuleniowe, świąd, wysypka skórna,

Ostrzeżenia

Przyjmowanie leku Moilec może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek.

Jeśli pacjent posiada kłopoty z sercem, przebył zawał oraz ma podwyższone ciśnienie, podwyższone stężenie cukru we krwi, zwiększone stężenie cholesterolu lub pali tytoń przed zastosowaniem powinien skontaktować się z lekarzem.

Jeśli w przeszłości pacjent cierpiał na zapalenie przełyku, zapalenie żołądka lub jakąkolwiek inną chorobę układu pokarmowego, na choroby serca, wątroby lub nerek, cukrzycę, zmniejszenie objętości krwi krążącej (hipowolemia), nietolerancję niektórych cukrów, miał wysokie stężenie potasu we krwi, ma podwyższone ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze) lub jest w podeszłym wieku przed zastosowaniem powinien skontaktować się z lekarzem w celu modyfikacji leczenia.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

GEDEON RICHTER POLSKA
ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki